

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт помірний. Листок середній. Цибулина велика за розміром, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка тонка, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Відсутня або дуже низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 30,0-75,0 т/га, товарна урожайність – 28,0-74,0 т/га, маса товарної цибулини 80,0-150,0 г, вегетаційний період 90,0-95,0 днів. Лежкість – 90-95%. Вміст вітаміну С, мг% – 5,0-8,2. Вміст сухої речовини в плоді, % – 11,5-12,2. Вміст загального цукру, % – 8,5-9,3.

07041010 Бугатті F1

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого;; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна врожайність, т/га 80, Вегетаційний період, днів 115, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5.

® 06041026 Батир

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна врожайність, т/га 35, Товарна урожайність, т/га 32, Маса товарної цибулини, г 120, Вегетаційний період, днів 135, Лежкість, % 97, Рівень достигання, % : перед збиранням 90, Рівень достигання 98, Придатність для механізованого збирання, балів 7, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Вміст : сухої речовини в плоді, % 11,9, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 8,8, Транспорتابельність, балів 7.

08041038 Бургос

Заявник: Вілморін

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт сильний. Листок довгий. Цибулина велика, висока, широкобернено-яйцевидної форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка товста, жовтого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність – 4,5 кг/м², вегетаційний період 130 днів. Ураженість хворобами: гнилями - 1 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %. Вміст вітаміну С, мг% - 4,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,0. Вміст загального цукру, % - 5,0.

Полісся, Лісостеп

Лісостеп, Степ

Закритий ґрунт