

08041032 Балстар F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини кількість листків на псевдостеблі від помірної до великої. Положення листя напівпряме, восковий наліт помірний. Листок середній за довжиною. Цибулина велика, висока, широкоеліптичної форми. Міцність тримання сухої шкіри після збирання помірна. Суха шкіра середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Кількість зачатків від дуже малої до малої. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 55,0 т/га, вегетаційний період 265 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 12,5. Вміст загального цукру, % - 6,2.

® 08041033 Валеро

Заявник: Нюнемс Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт відсутній або дуже слабкий. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкіри після збирання слабка. Суха шкіра середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 50-70 т/га, вегетаційний період 110 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,0. Вміст сухої речовини в плоді, % - 13,0. Вміст загального цукру, % - 12,0.

08041004 Варяг

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стебл: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; міцність тримання сухої шкіри цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкіри цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 25, Вегетаційний період, днів 104, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 34,6, Ураженість хворобами, % : гнилями 5,7, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1,5, Вміст : сухої речовини в плоді, % 12,5, Вміст : загального цукру, % 8,7, Вміст : вітаміну С, мг% 6,5

08041029 Варес F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини помірна кількість листків на псевдостеблі. Положення листя напівпряме, восковий наліт дуже сильний. Листок довгий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкіри після збирання від помірної до сильної. Суха шкіра товста, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 70,0 т/га, вегетаційний період 105 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 11,9. Вміст загального цукру, % - 6,2.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп

Лісостеп, Степ

Степ, Лісостеп, Полісся