

Вид: Гарбуз звичайний *Cucurbita pepo* L.

Заявка № 14150002 Назва сорту: Фаворит Заявник (код): 2029 Власник сорту (код): 2029

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171267

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	еліптична	2
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	плетистий	3
5	Рослина: галуження	наявне	9
6	Рослина: ступінь галуження	слабкий	3
7	Лише кушові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	ознака не визначається	0
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
10	Стебло: крапчастість	наявна	9
11	Стебло: вусики	добре розвинені	2
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7
13	Листкова пластинка: розсіченість	мілка	3
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	велика	7
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	ознака не визначається	0
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	ознака не визначається	0
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	зелене	4
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	сильна	7
30	Плід: переважна форма	поперечно широко-еліптична	3
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	середній	5
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	ознака не визначається	0
46	Плід: боріздки	наявні	9
47	Плід: боріздки за глибиною	дуже мілкі	1
48	Плід: ребра	відсутні	1
49	Плід: ступінь виявлення ребер	ознака не визначається	0
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	жовте	3
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	сильна	7
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на боріздках	наявні	9
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	жовті	2
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1

№	Ознака	Проявлення	Код
57	Плід: плямистість	наявна	9
58	Плід: розмір основних плям	малий	3
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	сильна	7
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	оранжеве	5
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	оранжеве	4
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2
77	Насінина: розмір	великий	7
78	Насінина: форма	еліптична	5
79	Насінина: лушпиння	відсутнє	1
80	Насінина: наявне лушпиння	ознака не визначається	0
81	Насінина: забарвлення	ознака не визначається	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду до досягання – 95 діб, вміст сухої речовини – 12,8 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**