

07041014 Ікарус F1

Степ

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10, Вміст :загального цукру, % 9,3, Вміст : вітаміну С, мг% 10,8

® 07041002 Корсар

Лісостеп, Степ

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Заявник: Приватне підприємство «Агросвіт». Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: сильна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: помірний; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: мала; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): поперечно-еліптична; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): заглиблена; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: червоний.

Загальна урожайність, т/га 50, Товарна урожайність, т/га 45, Маса товарної цибулини, г 110, Вегетаційний період, днів 105, Лежкість, % 75, Рівень достигання, % : перед збиранням 98, Придатність для механізованого збирання, балів 4,5, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,8, Вміст :загального цукру, % 6,8, Вміст : вітаміну С, мг% 5, Транспортбельність, балів 4,5.

08041016 Кассіопея

Степ, Лісостеп

Заявник: Енза Заден Біхір Б.В.

У рослини мала кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Цибулина середнього розміру, середньої висоти, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання сильна. Суха шкірка середньої товщини, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок зеленувате. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання середній. Відсутня або дуже низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 65,0 т/га, вегетаційний період 115 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,1. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,5. Вміст загального цукру, % - 10,7.

09041002 Копер Бол F1

Закритий ґрунт

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Рослина з великою кількістю листків на псевдостеблі. Листки напівпрямі, середні за довжиною та діаметром, з помірним восковим нальотом, слабкою інтенсивністю зеленого кольору, зігнутість відсутня або дуже слабка. Несправжнє стебло середнє за довжиною, діаметр середній. Цибулина не розщеплюється на цибулини, середнього розміру, широкояйцевидна, форма плеча верхівки та основи округла. Основний колір сухої шкірки коричневий.

Загальна врожайність – 3,5 кг/м², вегетаційний період 113 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 10,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,2. Вміст