

загального цукру, % - 9,3.

® 06041027 Оберіг

Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: пряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): попереочно-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 40, Товарна урожайність, т/га 38, Маса товарної цибулини, г 140, Вегетаційний період, днів 140, Лежкість, % 95, Рівень достигання, % : перед збиранням 92, Рівень достигання, % : після дозрівання 98, Придатність для механізованого збирання, балів 7, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 9, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Вміст : сухої речовини в плоді, % 11,3, Вміст : загального цукру, % 9,1, Вміст : вітаміну С, мг% 7,6, Транспортельність, балів 4,

08041028 Орізаба F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина за розміром від середньої до великої, за висотою від середньої до високої, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки від слабкої до помірної. Суха шкірка за товщиною від тонкої до середньої, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Кількість зачатків від дуже малої до малої. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, вегетаційний період 118 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,6. Вміст загального цукру, % - 6,2.

08041020 Песо

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): від середньої до довгої; восковий наліт листя: від дуже слабкого до слабкого; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: від малої до середньої; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від слабкої до помірної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: висока.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,9, Вміст : загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.4

08041018 Сафран F1

Степ, Лісостеп, Полісся