

загального цукру, % - 9,3.

## ® 06041027 Оберіг

Лісостеп, Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: пряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): попереочно-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: жовтий.

Загальна урожайність, т/га 40, Товарна урожайність, т/га 38, Маса товарної цибулини, г 140, Вегетаційний період, днів 140, Лежкість, % 95, Рівень достигання, % : перед збиранням 92, Рівень достигання, % : після дозрівання 98, Придатність для механізованого збирання, балів 7, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 9, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Вміст : сухої речовини в плоді, % 11,3, Вміст : загального цукру, % 9,1, Вміст : вітаміну С, мг% 7,6, Транспортність, балів 4,

## 08041028 Орізаба F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Монсанта Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя від прямого до напівпрямого, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина за розміром від середньої до великої, за висотою від середньої до високої, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки від слабкої до помірної. Суха шкірка за товщиною від тонкої до середньої, білого кольору. Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Кількість зачатків від дуже малої до малої. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Низька чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 80,0 т/га, вегетаційний період 118 днів. Вміст вітаміну С, мг% - 9,7. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,6. Вміст загального цукру, % - 6,2.

## 08041020 Песо

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): від середньої до довгої; восковий наліт листя: від дуже слабкого до слабкого; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: від малої до середньої; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від слабкої до помірної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: висока.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,9, Вміст : загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.4

## 08041018 Сафран F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: від помірного до сильного; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: від середньої до великої; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від помірної до сильної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 94, Вегетаційний період, днів 105, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10,1, Вміст : загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.6

## 08041021 Свіфт

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: дуже сильний; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): кругла; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росою 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9.8, Вміст : загального цукру, % 3, Вміст : вітаміну С, мг% 7.2

## 06041015 Сулов F1

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 45, Товарна урожайність, т/га 42, Маса товарної цибулини, г 220, Вегетаційний період, днів 110, Рівень достигання, % : перед збиранням 90, Транспорتابельність, балів 9.

## 08041027 Толука F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, білого кольору.

## Степ, Лісосотеп, Полісся

## Лісостеп

## Степ, Лісостеп, Полісся