

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: велика; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: від помірного до сильного; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: від середньої до великої; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка опукла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: від помірної до сильної; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 94, Вегетаційний період, днів 105, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росую 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 10,1, Вміст :загального цукру, % 3,2, Вміст : вітаміну С, мг% 7.6

08041021 Свіфт

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Заявник: Бейо Заден Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: напівпряме; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): коротка; восковий наліт листя: дуже сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): кругла; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): округла; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: слабка; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий; чоловіча стерильність рослини: відсутня або дуже низька.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 95, Ураженість хворобами, % : несправжньою борошнистою росую 3, Ураженість хворобами, % : гнилями 2, □Пошкодження шкідниками, % : цибулевою мухою 1, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,8, □Вміст :загального цукру, % 3, Вміст : вітаміну С, мг% 7.2

06041015 Сулов F1

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С

Заявник: Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. Кількість листків на псевдо стеблі: мала; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: слабка; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: сильний; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): широко-еліптична; форма основи цибулини/цибулинки (у повздовжньому розрізі): злегка конусовидна; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): злегка спадаюча; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: помірна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинки: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 45, Товарна урожайність, т/га 42, Маса товарної цибулини, г 220, Вегетаційний період, днів 110, Рівень достигання, % : перед збиранням 90, Транспортальність, балів 9.

08041027 Толука F1

Заявник: Монсанто Холланд Б.В.

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок середній. Цибулина середнього розміру, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка товста, білого кольору.

Степ, Лісосотеп, Полісся

Лісостеп

Степ, Лісостеп, Полісся

450
Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, вегетаційний період 122 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,8. Ураженість хворобами: несправжня борошниста роса - 70 %.

07041013 Шерпа

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наліт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулинки (з сухою шкірою навколо кожної цибулинки): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулинок (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулинок (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулинок: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 150, Вміст: сухої речовини в плоді, % 13, Вміст: загального цукру, % 9,8, Вміст: вітаміну С, мг% 10,5

Полісся, Лісостеп

Цибуля порей

09175001 Колумбус

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Рослина висока, щільність листків помірна, листки напівпрямі, сіро-зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наліт слабкий, жолобкуватість наявна. Стебло за довжиною та діаметром середні, формування цибулини помірне, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 45 т/га. Вегетаційний період - 85 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %; загального цукру - 6,5 %; вітаміну С - 35 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 3 %; гнилями - 3 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

08175003 Порбелла

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Рослина середня за висотою, щільність листків помірна, листки прямі, зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наліт помірний, жолобкуватість наявна. Стебло середнє за довжиною, товсте за діаметром середні, формування цибулини відсутнє або дуже слабке, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 4,5 кг/м². Вегетаційний період - 90 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 14 %; загального цукру - 3,0 %; вітаміну С - 12,0 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 7%; гнилями - 8 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 5 %.

Закритий ґрунт

Цибуля скорода (шніт)

® 09177001 Дівон

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт