

Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, вегетаційний період 122 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,8. Ураженість хворобами: несправжня борошниста роса - 70 %.

07041013 Шерпа

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наїт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкірою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розміром: середня; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 150, , Вміст : сухої речовини в плоді, % 13, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

Цибуля порей

09175001 Колумбус

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока, щільність листків помірна, листки напівпрямі, сіро-зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наїт слабкий, жолобкуватість наявна. Стебло за довжиною та діаметром середні, формування цибулини помірне, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 45 т/га. Вегетаційний період - 85 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %; загального цукру - 6,5 %; вітаміну С - 35 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 3 %; гнилями - 3 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %.

08175003 Порбелла

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою, щільність листків помірна, листки прямі, зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наїт помірний, жолобкуватість наявна. Стебло середнє за довжиною, товсте за діаметром середні, формування цибулини відсутнє або дуже слабке, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 4,5 кг/м². Вегетаційний період - 90 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 14 %; загального цукру - 3,0 %; вітаміну С - 12,0 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 7%; гнилями - 8 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 5 %.

Цибуля скорода (шніт)

® 09177001 Дівон

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт