

Забарвлення соковитих лусок відсутнє. Дуже мало зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання ранній. Висока чоловіча стерильність рослини.

Загальна врожайність – 60,0 т/га, вегетаційний період 122 днів. Вміст сухої речовини в плоді, % - 10,8. Ураженість хворобами: несправжня борошниста роса - 70 %.

07041013 Шерпа

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Полісся, Лісостеп

Заявник: Нікерсон – Цваан Б.В. Кількість листків на псевдо стеблі: помірна; Інтенсивність забарвлення листової пластинки: помірна; Положення листя: від прямого до напівпрямого; довжина несправжнього стебла (до найвищого зеленого листка): середня; восковий наїт листя: слабкий; розщеплення цибулини на цибулини (з сухою шкірою навколо кожної цибулини): відсутнє; цибулина за розк. форм: середня; основна форма цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): яйцевидна; форма основи цибулини/цибулини (у повздовжньому розрізі): плеската; форма плеча верхівки цибулини (у повздовжньому розрізі): округла; міцність тримання сухої шкірки цибулини після збирання: сильна; основний колір сухої шкірки цибулини/цибулини: коричневий.

Загальна урожайність, т/га 95, Вегетаційний період, днів 150, , Вміст : сухої речовини в плоді, % 13, Вміст :загального цукру, % 9,8, Вміст : вітаміну С, мг% 10,5

Цибуля порей

09175001 Колумбус

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослина висока, щільність листків помірна, листки напівпрямі, сіро-зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наїт слабкий, жолобкуватість наявна. Стебло за довжиною та діаметром середні, формування цибулини помірне, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 45 т/га. Вегетаційний період - 85 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %; загального цукру - 6,5 %; вітаміну С - 35 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 3 %; гнилями - 3 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 2 %.

08175003 Порбелла

Заявник: Нікерсон - Цваан Б.В.

Закритий ґрунт

Рослина середня за висотою, щільність листків помірна, листки прямі, зеленого кольору. Антоціанове забарвлення на листовій пластинці відсутнє або дуже слабке, восковий наїт помірний, жолобкуватість наявна. Стебло середнє за довжиною, товсте за діаметром середні, формування цибулини відсутнє або дуже слабке, звуження до основи відсутнє. Квітка біла за кольором.

Загальна врожайність - 4,5 кг/м². Вегетаційний період - 90 днів. Вміст: сухої речовини у плоді - 14 %; загального цукру - 3,0 %; вітаміну С - 12,0 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 7%; гнилями - 8 %. Пошкодження шкідниками: цибулевою мухою - 5 %.

Цибуля скорода (шніт)

® 09177001 Дівон

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Степ, Лісостеп, Полісся, закритий ґрунт

Рослина за типом росту багатостеблова, середня кількість несправжніх стебел, середня за висотою, за габітусом напівпіднесена. Листки блакитно-зелені за забарвленням, короткі, середні за товщиною, восковий наліт помірний. Несправжнє стебло середнє за довжиною, тонке, антоціанове забарвлення наявне. Суцвіття за довжиною середнє. Час початку цвітіння пізній. Загальна врожайність - 50 т/га, тривалість вегетаційного періоду - 100 днів. Вміст сухої речовини в цибуліні - 11 %; загального цукру - 12 %; вітаміну С - 7 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 0,1 %; гнилями - 0,1 %.

Цибуля шалот

Полісся

® 08176002 Оксамит

Заявник: Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина велика, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність - 25,0 т/га, вегетаційний період 68 днів. Ураження хворобами: несправжньою борошнистою росою - 2 %, гнилями - 10 %. Вміст вітаміну С, мг% - 17,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,9. Вміст загального цукру, % - 8,6.

Шпинат городній

09179003 Ель Форте F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин дуже багато часток однодомних рослин, відсутня або дуже мала кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 200 ц/га; днів до досягання 55; ураження хворобами: пероноспорозом - 10%.

® 08179003 Переможець

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Листкова пластинка має широко-еліптичну форму, тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі плеската. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими квітками, мала кількість з чоловічими квітками.

Товарний урожай 212 ц/га; днів до досягання 26.

Гарбуз мускусний

Степ, Лісостеп

® 08429002 Бальзам

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором жовте, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка середня за розміром, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька.

Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня нерівна, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість