

Рослина за типом росту багатостеблова, середня кількість несправжніх стебел, середня за висотою, за габітусом напівпіднесена. Листки блакитно-зелені за забарвленням, короткі, середні за товщиною, восковий наліт помірний. Несправжнє стебло середнє за довжиною, тонке, антоціанове забарвлення наявне. Суцвіття за довжиною середнє. Час початку цвітіння пізній. Загальна врожайність - 50 т/га, тривалість вегетаційного періоду - 100 днів. Вміст сухої речовини в цибуліні - 11 %; загального цукру - 12 %; вітаміну С - 7 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 0,1 %; гнилями - 0,1 %.

Цибуля шалот

Полісся

® 08176002 Оксамит

Заявник: Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина велика, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність - 25,0 т/га, вегетаційний період 68 днів. Ураження хворобами: несправжньою борошнистою росою - 2 %, гнилями - 10 %. Вміст вітаміну С, мг% - 17,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,9. Вміст загального цукру, % - 8,6.

Шпинат городній

Степ, Лісостеп, Полісся

09179003 Ель Форте F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин дуже багато часток однодомних рослин, відсутня або дуже мала кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 200 ц/га; днів до досягання 55; ураження хворобами: пероноспорозом - 10%.

® 08179003 Переможець

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Листкова пластинка має широко-еліптичну форму, тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі плеската. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими квітками, мала кількість з чоловічими квітками.

Товарний урожай 212 ц/га; днів до досягання 26.

Степ, Лісостеп, Полісся

Гарбуз мускусний

Степ, Лісостеп

® 08429002 Бальзам

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором жовте, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка середня за розміром, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька.

Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня нерівна, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість