

Рослина за типом росту багатостеблова, середня кількість несправжніх стебел, середня за висотою, за габітусом напівпіднесена. Листки блакитно-зелені за забарвленням, короткі, середні за товщиною, восковий наліт помірний. Несправжнє стебло середнє за довжиною, тонке, антоціанове забарвлення наявне. Суцвіття за довжиною середнє. Час початку цвітіння пізній.

Загальна врожайність - 50 т/га, тривалість вегетаційного періоду - 100 днів. Вміст сухої речовини в цибулині - 11 %; загального цукру - 12 %; вітаміну С - 7 мг%. Ураженість хворобами: несправжньою борошнистою росою - 0,1 %; гнилями - 0,1 %.

Цибуля шалот

Полісся

® 08176002 Оксамит

Заявник: Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

У рослини велика кількість листків на псевдостеблі. Положення листя пряме, восковий наліт слабкий. Листок довгий. Цибулина велика, висока, округлої форми. Міцність тримання сухої шкірки після збирання помірна. Суха шкірка середня за товщиною, коричневого кольору. Забарвлення соковитих лусок червонувате. Середня кількість зачатків. Початок проростання цибулини протягом зберігання пізній. Чоловіча стерильність рослини відсутня або дуже низька.

Загальна врожайність – 25,0 т/га, вегетаційний період 68 днів. Ураження хворобами: несправжньою борошнистою росою - 2 %, гнилями - 10 %. Вміст вітаміну С, мг% - 17,6. Вміст сухої речовини в плоді, % - 16,9. Вміст загального цукру, % - 8,6.

Шпинат городній

Степ, Лісостеп, Полісся

09179003 Ель Форте F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Листкова пластинка має тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі опукла. У квітучих рослин дуже багато часток однодомних рослин, відсутня або дуже мала кількість рослин з жіночими і чоловічими квітками.

Товарний урожай 200 ц/га; днів до досягання 55; ураження хворобами: пероноспорозом - 10%.

® 08179003 Переможець

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Листкова пластинка має широко-еліптичну форму, тупу форму верхівки, форма у поздовжньому розрізі плеската. У квітучих рослин мала частка однодомних рослин, середня кількість рослин з жіночими квітками, мала кількість з чоловічими квітками.

Товарний урожай 212 ц/га; днів до досягання 26.

Гарбуз мускусний

Степ, Лісостеп

® 08429002 Бальзам

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором жовте, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка середня за розміром, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня нерівна, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість

кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 359 ц/га; вміст сухої речовини - 9,1 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,9 %.

® 08429001 Доля

Степ, Лісостеп

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, велика кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка за розміром середня, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Поверхня плоду гладенька, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 293 ц/га; днів до досягання - 124; вміст сухої речовини - 8,4 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 %.

Гарбуз крупноплідний

® 08415001 Ювілей

Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округле за формою, має середнє жорстке опушення. Листкова пластинка за розміром велика, округла, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення шорстке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня сегментована, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір сірий. М'якуш за товщиною товстий, основний колір червоно-оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня гладенька.

Товарний урожай - 287 ц/га; днів до досягання - 126; вміст сухої речовини - 12,0 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 3,4 %.

Селера коренеплідна

09167001 Президент

Закритий ґрунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Розмір верхівкового листочка великий. Черешок короткий. Коренеплід великого розміру, є незначні виступи на поверхні. Основний колір шкірки коренеплоду білуватий, забарвлення м'якуша біле.

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 141 доба. Висота рослин 60 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Стійкість до обсіпання 9 балів. Зимостійкість 9 балів. Посухостійкість 7 балів. Збір сухої речовини в середньому за рік використання 1,5 т/га. Ураженість хворобами: борошнистою росою 1%; септоріозом 1%; білою гниллю 0,5%. Вміст білка 1,5%. Вміст клітковини 1,9%.

Монарда двійчаста

® 08484001 Слава