

кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 359 ц/га; вміст сухої речовини - 9,1 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,9 %.

® 08429001 Доля

Степ, Лісостеп

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, велика кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка за розміром середня, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Поверхня плоду гладенька, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 293 ц/га; днів до достигання - 124; вміст сухої речовини - 8,4 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 0,5 %.

® 08415001 Ювілей

Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округле за формою, має середнє жорстке опушення. Листкова пластинка за розміром велика, округла, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення шорстке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня сегментована, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір сірий. М'якуш за товщиною товстий, основний колір червоно-оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня гладенька.

Товарний урожай - 287 ц/га; днів до достигання - 126; вміст сухої речовини - 12,0 %. Ураженість хворобами: борошнистою росою - 3,4 %.

09167001 Президент

Закритий ґрунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Розмір верхівкового листочка великий. Черешок короткий. Коренеплід великого розміру, є незначні виступи на поверхні. Основний колір шкірки коренеплоду білуватий, забарвлення м'якуша біле.

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 141 доба. Висота рослин 60 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Стійкість до обсіпання 9 балів. Зимостійкість 9 балів. Посухостійкість 7 балів. Збір сухої речовини в середньому за рік використання 1,5 т/га. Ураженість хворобами: борошнистою росою 1%; септоріозом 1%; білою гниллю 0,5%. Вміст білка 1,5%. Вміст клітковини 1,9%.

® 08484001 Слава

Монарда двійчаста