

кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 359 ц/га; вміст сухої речовини - 9,1 %. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 0,9 %.

® 08429001 Доля

Степ, Лісостеп

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, велика кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округло-гранчасте за формою, має середнє м'яке опушення. Листкова пластинка за розміром середня, нирковидна, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення м'яке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Поверхня плоду гладенька, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір коричневий. М'якуш товстий, основний колір оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня шорстка.

Товарний урожай - 293 ц/га; днів до достигання - 124; вміст сухої речовини - 8,4 %. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 0,5 %.

Гарбуз крупноплідний

® 08415001 Ювілей

Степ

Заявник: Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослина за габітусом плетиста, середня кількість стебел. Стебло за кольором зелене, округле за формою, має середнє жорстке опушення. Листкова пластинка за розміром велика, округла, зазубленість краю та розсіченість відсутні, поверхня гладенька. Черешок середній за довжиною та товщиною, опушення шорстке, положення відносно ґрунту вертикальне. Основний колір плодоніжки плоду зелений. Форма плоду плеската, поверхня сегментована, сітка і тріщини на корі відсутні, гофрованість основи відсутня, кількість кольорів кори один, основний колір сірий. М'якуш за товщиною товстий, основний колір червоно-оранжевий, структура щільна. Насінина за формою еліптична, поверхня гладенька.

Товарний урожай - 287 ц/га; днів до достигання - 126; вміст сухої речовини - 12,0 %. Ураженість хворобами: борошнистою россою - 3,4 %.

09167001 Президент

Закритий ґрунт

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина середня за висотою. Розмір верхівкового листочка великий. Черешок короткий. Коренеплід великого розміру, є незначні виступи на поверхні. Основний колір шкірки коренеплоду білуватий, забарвлення м'якуша біле.

Тривалість періоду від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості 141 доба. Висота рослин 60 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Стійкість до обсіпання 9 балів. Зимостійкість 9 балів. Посухостійкість 7 балів. Збір сухої речовини в середньому за рік використання 1,5 т/га. Ураженість хворобами: борошнистою россою 1%; септоріозом 1%; білою гниллю 0,5%. Вміст білка 1,5%. Вміст клітковини 1,9%.

Монарда двійчаста

® 08484001 Слава

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та насупних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – велика, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листка середня, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення сильна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листка помірна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галушення стебла наявне, інтенсивність галушення помірна, висота прикріплення нижнього пагона висока, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення наявне, нижня частина стебла з антоціановим забарвленням, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром середнє, на стеблі суцвіть багате, ярусність – наявна, розмір приквітків (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітків (брактеол) сильне, основне забарвлення квітки лілове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484002 Серпанок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та насупних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – середня, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листка довга, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення помірна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листка сильна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галушення стебла відсутнє, інтенсивність галушення відсутнє або дуже слабке, опушення стебла сильне, антоціанове забарвлення наявне, з антоціановим забарвленням все стебло, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння ранній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть мало, ярусність – відсутня, розмір приквітків (брактеол) середній, антоціанове забарвлення приквітків (брактеол) помірне, основне забарвлення квітки бузкове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484003 Сніжана

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – мала, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення відсутнє, довжина пластинки листка середня, ширина пластинки – широка, інтенсивність зеленого забарвлення світла, форма пластинки – яйцевидна, зубчастість краю листка слабка, пухирчатість – наявна, черешок середньої довжини. Галушення стебла наявне, інтенсивність галушення помірна, висота прикріплення нижнього пагона середня, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення відсутнє, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть середня кількість, ярусність – відсутня, розмір приквітків (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітків (брактеол) відсутнє або дуже слабке, основне забарвлення квітки