

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – велика, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листа середня, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення сильна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листа помірна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галузнення стебла наявне, інтенсивність галузнення помірне, висота прикріплення нижнього пагона висока, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення наявне, нижня частина стебла з антоціановим забарвленням, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром середнє, на стеблі суцвіть багато, ярусність – наявна, розмір приквітков (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) сильне, основне забарвлення квітки лілове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484002 Серпанок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – середня, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листа довга, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення помірна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листа сильна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галузнення стебла відсутнє, інтенсивність галузнення відсутнє або дуже слабке, опушення стебла сильне, антоціанове забарвлення наявне, з антоціановим забарвленням все стебло, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння ранній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть мало, ярусність – відсутня, розмір приквітков (брактеол) середній, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) помірне, основне забарвлення квітки бузкове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484003 Сніжана

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – мала, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення відсутнє, довжина пластинки листа середня, ширина пластинки – широка, інтенсивність зеленого забарвлення світла, форма пластинки – яйцевидна, зубчастість краю листа слабка, пухирчатість – наявна, черешок середньої довжини. Галузнення стебла наявне, інтенсивність галузнення помірне, висота прикріплення нижнього пагона середня, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення відсутнє, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть середня кількість, ярусність – відсутня, розмір приквітков (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) відсутнє або дуже слабке, основне забарвлення квітки