

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – велика, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листа середня, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення сильна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листа помірна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галузнення стебла наявне, інтенсивність галузнення помірне, висота прикріплення нижнього пагона висока, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення наявне, нижня частина стебла з антоціановим забарвленням, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром середнє, на стеблі суцвіть багато, ярусність – наявна, розмір приквітков (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) сильне, основне забарвлення квітки лілове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484002 Серпанок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення сильна, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – середня, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення наявне, інтенсивність антоціанового забарвлення помірна, довжина пластинки листа довга, ширина пластинки – середня, інтенсивність зеленого забарвлення помірна, форма пластинки – видовжено-яйцевидна, зубчастість краю листа сильна, пухирчатість – відсутня, черешок середньої довжини. Галузнення стебла відсутнє, інтенсивність галузнення відсутнє або дуже слабке, опушення стебла сильне, антоціанове забарвлення наявне, з антоціановим забарвленням все стебло, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння ранній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть мало, ярусність – відсутня, розмір приквітков (брактеол) середній, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) помірне, основне забарвлення квітки бузкове, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок помірна, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

® 08484003 Сніжана

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина: антоціанове забарвлення відсутнє, за висотою (другого та наступних років) висока, за діаметром (другого та наступних років) – мала, габітус – прямий. Листок: закрученість верхньої пари листків по спіралі відсутня, антоціанове забарвлення відсутнє, довжина пластинки листа середня, ширина пластинки – широка, інтенсивність зеленого забарвлення світла, форма пластинки – яйцевидна, зубчастість краю листа слабка, пухирчатість – наявна, черешок середньої довжини. Галузнення стебла наявне, інтенсивність галузнення помірне, висота прикріплення нижнього пагона середня, опушення стебла відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення відсутнє, форма поперечного перерізу стебла гостро кута. Час початку цвітіння пізній. Суцвіття: за діаметром велике, на стеблі суцвіть середня кількість, ярусність – відсутня, розмір приквітков (брактеол) великий, антоціанове забарвлення приквітков (брактеол) відсутнє або дуже слабке, основне забарвлення квітки

біле, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок відсутня або дуже слабка, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

Огірочник лікарський

® 08487001 Космічний

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина висока за висотою, габітус (розетка) напіврозлогий, інтенсивність зеленого забарвлення листків темне, довжи на листової пластинки розеткового листка довга, ширина – середня, за розміром листок (відношення ширина/довжина) великий, форма листової пластинки широкоеліптична, форма краю – слабо хвиляста, пухирчастість листка сильна, опушеність – помірна, черешок середній за довжиною. Стебло: опушеність наявна, ступінь опушення помірне, за діамет ром – середнє, кількість міжвузлів середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка. Час цвітіння росли ни ранній, тривалість періоду від сходів до споживчої стиглості середній, тривалість вегетаційного періоду (до повного досягання насіння) середній, квітка середнього розміру синьо-зеленого забарвлення, тип суцвіття – щитковидна волоть. Достигання насіння дуже розтягнуто, форма насіння обернено яйцеподібна, маса 1000 насінин велика.

Сільськогосподарські: інші

Гісоп лікарський

® 08376001 Водограй

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп

У сходів антоціанове забарвлення відсутнє. Рослина за висотою куща середня, за габітусом – напіврозлога, діаметр куща великий, кількість стебел середня, залистяність рослини сильна, діаметр стебла середній, кількість гілочок першого по рядку середня. Положення листків напіввертикальне, опушеність листків слабка, забарвлення – зелене, за довжиною і шириною листок середній, глянуватість листової пластинки помірна, пухирчастість – слабка. Час цвітіння рослини пізній, тривалість періоду цвітіння середня. Кількість квіток у несправжній кільчатці середня, квітка за довжиною середня, суцвіття за довжиною довге, нещільне, язичкові квітки суцвіття білого кольору. Час повної стиглості насіння пізній, маса 1000 насінин середня, насіння за довжиною і шириною середня. Вміст ефірної олії на сиру масу високий, вміст ізопінокамфору середній, пінокамфору – високий.

Урожайність наземної зеленої маси 20 т/га, вміст ефірної олії 0,26 %, вміст пінокамфору – 39,3 %, вміст ізопінокамфору – 28,5 %, збір ефірної олії 52 кг/га. Висота рослин 75 см, цвітіння дружне, стійкі до вилягання. Сорт морозо- та посухостійкий. Стійкість до основних хвороб і шкідників дуже висока.

Сафлор красильний

® 09323001 Лагідний

Заявник:

Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Зона вирощування: Степ, Лісостеп