

**454**  
біле, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоена, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок відсутня або дуже слабка, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

## Огроочник лікарський

® 08487001 Космічний

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина висока за висотою, габітус (розетка) напівроздогий, інтенсивність зеленого забарвлення листків темне, довжи на листкової пластинки розеткового листка довга, ширина – середня, за розміром листок (відношення ширини/довжина) великий, форма листкової пластинки широкоеліптична, форма краю – слабко хвиляста, пухирчастість листка сильна, опущеність – помірна, черешок середній за довжиною. Стебло: опущеність наявна, ступінь опущення помірне, за діаметром – середнє, кількість міжузлів середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка. Час цвітіння рослини ранній, тривалість періоду від сходів до споживчої стигlosti середній, тривалість вегетаційного періоду (до повного достигання насіння) середній, квітка середнього розміру синьо-зеленого забарвлення, тип суцвіття – щитковидна волоть. Достигання насіння дуже розтягнуто, форма насінини обернено яйцеподібна, маса 1000 насінин велика.

## Сільськогосподарські: інші

Гікоп лікарський

® 08376001 Водограй

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

У сходів антоціанове забарвлення відсутнє. Рослина за висотою куща середня, за габітусом – напіврозлога, діаметр куща великий, кількість стебел середня, залиштканість рослини сильна, діаметр стебла середній, кількість гілочек первого по рядку середня. Положення листків напіввертикальне, опущеність листків слабка, забарвлення – зелене, за довжиною і шириною листок середній, глянсуватість листкової пластинки помірна, пухирчастість – слабка. Час цвітіння рослини пізній, тривалість періоду цвітіння середня. Кількість квіток у несправжній кільчачці середня, квітка за довжиною середня, суцвіття за довжиною довге, нещільне, язичкові квітки суцвіття білого кольору. Час повної стигlosti насіння пізній, маса 1000 насінин середня, насіння за довжиною і ширину середня. Вміст ефірної олії на сиру масу високий, вміст ізопінокамфору середній, пінокамфору – високий.

Урожайність наземної зеленої маси 20 т/га, вміст ефірної олії 0,26 %, вміст пінокамфору – 39,3 %, вміст ізопінокамфору – 28,5 %, збір ефірної олії 52 кг/га. Висота рослин 75 см, цвітіння дружне, стикі до вилігання. Сорт морозо- та посухостійкий Стійкість до основних хвороб і шкідників дуже висока.

## Сафролор красильний

® 09323001 Лагідний

Заявник:

Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Зона вирощування: Степ, Лісостеп