

біле, форма середньої частки нижньої губи квітки не роздвоєна, інтенсивність антоціанового забарвлення чашечок відсутня або дуже слабка, форма чашечки відкрита. Плід (горішок) за довжиною середній, маса 1000 плодів середня.

Огірочник лікарський

® 08487001 Космічний

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Рослина висока за висотою, габітус (роzetка) напіврозлогий, інтенсивність зеленого забарвлення листків темне, довжи на листової пластинки розеткового листка довга, ширина – середня, за розміром листок (відношення ширина/довжина) великий, форма листової пластинки широкоеліптична, форма краю – слабо хвиляста, пухирчастість листка сильна, опушеність – помірна, черешок середній за довжиною. Стебло: опушеність наявна, ступінь опушення помірне, за діамет ром – середнє, кількість міжвузлів середня, інтенсивність антоціанового забарвлення стебла слабка. Час цвітіння росли ни ранній, тривалість періоду від сходів до споживчої стиглості середній, тривалість вегетаційного періоду (до повного досягання насіння) середній, квітка середнього розміру синьо-зеленого забарвлення, тип суцвіття – щитковидна волоть. Досягання насіння дуже розтягнуто, форма насінини обернено яйцеподібна, маса 1000 насінин велика.

Сільськогосподарські: інші

Гісоп лікарський

® 08376001 Водограй

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

У сходів антоціанове забарвлення відсутнє. Рослина за висотою куща середня, за габітусом – напіврозлога, діаметр куща великий, кількість стебел середня, залистаність рослини сильна, діаметр стебла середній, кількість гілочок першого по рядку середня. Положення листків напіввертикальне, опушеність листків слабка, забарвлення – зелене, за довжиною і шириною листок середній, глянсуватість листової пластинки помірна, пухирчатість – слабка. Час цвітіння рослини пізній, тривалість періоду цвітіння середня. Кількість квіток у несправжній кільчатці середня, квітка за довжиною середня, суцвіття за довжиною довге, нещільне, язичкові квітки суцвіття білого кольору. Час повної стиглості насіння пізній, маса 1000 насінин середня, насінина за довжиною і шириною середня. Вміст ефірної олії на сиру масу високий, вміст ізопінокамфору середній, пінокамфору – високий.

Урожайність наземної зеленої маси 20 т/га, вміст ефірної олії 0,26 %, вміст пінокамфору – 39,3 %, вміст ізопінокамфору – 28,5 %, збір ефірної олії 52 кг/га. Висота рослин 75 см, цвітіння дружнє, стійкі до вилягання. Сорт морозо- та посухостійкий. Стійкість до основних хвороб і шкідників дуже висока.

Сафлор красильний

® 09323001 Лагідний

Зона вирощування: Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Висота рослини на 15 день після появи сходів середня, висота місця прикріплення першої гілки середня, довжина найдовшої первинної гілки середня. Первинний листок: довжина пластинки середня, ширина пластинки – широка, відношення довжини до ширини пластинки середнє, довжина черешка листка дуже коротка. колючки відсутні на первинному листку, або дуже мало, зубчастість відсутня, або дуже слабка. Час цвітіння середній, суцвіття розміщені високо, язичкова квітка оранжева, довжина та ширина середнього приквітка суцвіття середня, відношення довжи

ни до ширини приквітка середнє, колючки на середньому приквітку суцвіття відсутні або дуже мало, зміна кольору язичкової квітки наявна. Шостий листок: помірного зеленого кольору, за довжиною і шириною пластинки середній, відношення довжини до ширини пластинки середнє, яйцевидної форми, колючки на шостому листку відсутні або їх дуже мало, зубчастість відсутня або дуже слабка. Маса 1000 насінин середня, сім'янка середнього розміру, біла за кольором, вміст олії середній, вміст олеїнової кислоти середній.

За даними заявника урожайність насіння 20,5 ц/га, маса 1000 насінин 44 г, висота рослин 99 см, тривалість вегетаційного періоду 110 діб, середня тривалість цвітіння 14 діб. Стійкість до посухи дуже висока, до осипання, вилягання – висока, стійкість до основних хвороб 8 балів, до шкідників – 3 бали. Вміст жирної олії 31,5 %.

Хміль звичайний

10021001 Ньюпорт

Лісостеп, Полісся

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки середня. Листки середнього розміру, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння ранній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистяність помірна, шишок багато, верхньої третини рослини пагони короткі, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок середній. Шишка широкоовальна, мала, луски повністю відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,8 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 135 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 89 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: фузаріозом – 15%, псевдопереноспорозом – 23%, попелицею 20%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 17, коефіцієнт ароматичності – 0,55, кількість ефірної олії – 2,4%. Напрямок використання - пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

10021002 Наггет

Лісостеп, Полісся

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки висока. Листки великі, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння середній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистяність помірна, шишок середня кількість, верхньої третини рослини пагони середньої довжини, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок пізній. Шишка овальна, середня, луски злегка відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,2-2,5 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 129 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 82 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: кореневими гнилями 11%, псевдопереноспорозом – 20%, попелицею 21%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 14, коефіцієнт ароматичності – 0,42, кількість ефірної олії – 1,4%.

Напрямок використання - пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

Плодові та ягідні