

Висота рослини на 15 день після появи сходів середня, висота місця прикріплення першої гілки середня, довжина найдовшої первинної гілки середня. Первинний листок: довжина пластинки середня, ширина пластинки – широка, відношення довжини до ширини пластинки середнє, довжина черешка листка дуже коротка. Колючки відсутні на первинному листку, або дуже мало, зубчастість відсутня, або дуже слабка. Час цвітіння середній, суцвіття розміщені високо, язичкова квітка середнього приквітка суцвіття середня, відношення довжини до ширини приквітка середнє, колючки на середньому приквітку суцвіття відсутні або дуже мало, зміна кольору язичкової квітчини до ширини приквітка: помірною зеленою кольору, за довжиною і шириною пластинки середній, відношення довжини до ширини пластинки середнє, яйцевидної форми, колючки на шостому листку відсутні або їх дуже мало, зубчастість відсутня або дуже слабка. Маса 1000 насінин середня, сім'янка середнього розміру, біла за кольором, вміст олійної кислоти середній.

За даними заявника урожайність насіння 20,5 ц/га, маса 1000 насінин 44 г, висота рослин 99 см, тривалість вегетаційного періоду 110 діб, середня тривалість цвітіння 14 діб. Стійкість до посухи дуже висока, до осипання, вилягання – висока, стійкість до основних хвороб 8 балів, до шкідників – 3 бали. Вміст жирної олії 31,5 %.

Хміль звичайний

Лісостеп, Полісся

10021001 Ньюпорт

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки середня. Листки середнього розміру, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння ранній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистаність помірна, шишок багато, верхньої третини рослини пагони короткі, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок середній. Шишка широкоовальна, мала, луски повністю відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,8 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 135 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 89 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: фузаріозом – 15%, псевдопереноспорозом – 23%, попелицею 20%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 17, коефіцієнт ароматичності – 0,55, кількість ефірної олії – 2,4%. Напрямок використання – пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

10021002 Нагет

Заявник: Фірма "Агрос"

*Рослина веретеноподібної форми, тип росту нормальний, маса верхівки висока. Листки великі, пухирчастість з верхнього боку слабка. Час початку цвітіння середній. Бічні пагони середньої третини рослини за довжиною середні, залистаність помірна, шишок середня кількість, верхньої третини рослини пагони середньої довжини, шишок – середня кількість. Час збирання стиглих шишок пізній. Шишка овальна, середня, луски злегка відкриті, помірно зеленого кольору.

*Урожайність повітряно сухих шишок 2,2-2,5 т/га. Тривалість вегетаційного періоду 129 днів. Висота рослини 12 м. Маса 100 сухих шишок 82 г. Зимостійкість 5 балів. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками: кореневими гнилями 11%, псевдопереноспорозом – 20%, попелицею 21%. Вміст, % на суху речовину: загальних смол – 3,4, альфа-кислот – 14, коефіцієнт ароматичності – 0,42, кількість ефірної олії – 1,4%.

Напрямок використання - пивоваріння, парфумерна промисловість. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони - Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника

Плодові та ягідні

455