

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.
Заявка № 23155002 **Назва сорту:** Фараон Носівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990
Володілець патенту (код): 1990
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.04.2025 **Патент №** 250131
Дата пріоритету: 20.11.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.04.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250272
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за природною висотою без яровизації	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення без яровизації	помірна	5	
7	Рослина: габітус	проміжний	5	
8	Рослина: схильність до цвітіння без яровизації	помірна	5	
9	Рослина: за природною висотою після яровизації	висока	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення після яровизації	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
15	Стебло: опушення за щільністю	дуже нещільне	1	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Центральний листочок: за довжиною	довгий	7	
18	Центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: прояв малюнка	помірний	5	до сильного
20	Рослина: за природною висотою за другого укусу	середня	5	
21	Черешок: опушення за щільністю	помірне	5	
22	Листок: прояв малюнка	від помірного до сильного	6	
23	Листок: черешок за довжиною	середній	5	

За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності
Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,72. Збір сухої речовини, т/га – 16,9. Вміст у сухій речовині, %: білка – 19,6, клітковини – 25,0. Тривалість періоду від весняного відростання до укїсної стиглості, діб – 64. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 110. Кількість укусів, шт. – 3. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Маса 1000 насінин, г – 1,66. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 9. Облістяність, % – 51,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошніста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *trifolii* Rbnh.) – 9, іржа (*Uromyces fallens* Kern.) – 9, антракноз (*Kabatiella caulivora* Kat.) – 9, аскохітоз (*Ascochyta trifolii* Bond. et Trus.) – 9, бура плямистість (*Pseudopeziza trifolii* (Biv.-Bern.) Fuck.) – 9, бактеріоз (*Phytophthora trifoliorum* (L. R. Jones) Burkh.; *Pseudomonas trifoliorum* Stapp) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* Schl. f. *trifolii* Railllo) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): насіннеїд конюшиновий – 8.
Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.