

® 07070003 Гамлет

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильної сили росту, слабо розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Кількість сочевичок середня. Листкова пластинка великого розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - короткозагострена. Край - двічі-зубчастий, слабо хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною товстий. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - злегка шишувата. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть світло-оранжева, проміжна, середньої твердості. Кісточка подовжена. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 115 (ц/га), урожай з дерева 34,5 (кг). Зимостійкість 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 14,6%, вміст загальної цукру - 14,6%, загальна кислотність - 1,72%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070007 Дивний

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок мало. Листкова пластинка середнього розміру, зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - короткозагострена. Край - округло-зубчастий, слабо хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід середній, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть світло-оранжева, ніжна, середньої твердості. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 36 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 48,5%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 14%, вміст загальної цукру - 12,9%, вміст каротину - 1,23%, загальна кислотність - 2,20%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070002 Костінський

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка дуже великого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - подовженозагострена. Край - округло-зубчастий, слабо хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть кремова, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 100 (ц/га), урожай з дерева 36 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 40%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 7; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 17,5%, вміст загальної цукру - 13,9%, вміст каротину - 0,5%, загальна кислотність - 0,7%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника