

® 07070008 Крокус

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

\*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка великого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - середньозагострена. Край - двічі-зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка середній. Квітка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - оранжевий. М'якоть оранжева, за щільністю проміжна, тверда. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

\*За даними заявника: урожайність товарна 120 (ц/га), урожай з дерева 43 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 24,8%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніпальним опіком - 3; клястистероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,5%, вміст загального цукру - 12,9%, загальна кислотність -1,9%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

\* Дані заявника

® 07070004 Наслажденіє

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

\*Дерево сильноросле, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка середнього розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - коротко-загострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть кремова, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

\*За даними заявника: урожайність товарна 95 (ц/га), урожай з дерева 34 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 38,2%, стійкість до посухи 9 балів, ураженість хворобами, балів: моніпальним опіком - 3; клястистероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,4%, вміст загального цукру - 8,2%, вміст каротину - 2,5%, загальна кислотність -0,6%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

\* Дані заявника

® 07070005 Пам'яті Агесвой

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

\*Дерево середньої сили росту, слабко розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка середнього розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - подовженозагострена. Край - двічізубчастий, сильно хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка широко-еліптичний. Плід середній, переважно асиметричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

\*За даними заявника: урожайність товарна 150 (ц/га), урожай з дерева 54 (кг) Зимостійкість 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніпальним опіком - 5; клястистероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 19,1%, вміст загального цукру - 13,3%, загальна кислотність -1,16%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

\* Дані заявника

® 10070001 Южанін

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ