

® 07070008 Крокус

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка великого розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - середньозагострена. Край - двічі-зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - оранжевий. М'якоть оранжева, за щільністю проміжна, тверда. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 120 (ц/га), урожай з дерева 43 (кг) Зимостійкість 7 балів, вимерзання квіткових бруньок, 24,8%, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,5%, вміст загального цукру - 12,9%, загальна кислотність -1,9%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070004 Наслаждєніє

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево сильноросле, розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато. Листкова пластинка середнього розміру, темно-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - звужена, верхівка - коротко-загострена. Край - зубчастий, помірно хвилястий. Черешок листка довгий, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка округла. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - від кремового до жовтого. М'якоть кремова, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт середньопізній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 95 (ц/га), урожай з дерева 34 (кг) Зимостійкість 5 балів, вимерзання квіткових бруньок, 38,2%, стійкість до посухи 9 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 3; клястероспоріозом - 3. Вміст сухої речовини в плодах - 17,4%, вміст загального цукру - 8,2%, вміст каротину - 2,5%, загальна кислотність -0,6%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 07070005 Пам'яті Агеєвой

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Дерево середньої сили росту, слабо розлоге. У молодого пагона помірне антоціанове забарвлення верхівки. Сочевичок багато.

Листкова пластинка середнього розміру, світло-зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа - зрізана, верхівка - подовженозагострена. Край - двічізубчастий, сильно хвилястий. Черешок листка середній, за товщиною середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка широко-еліптична. Плід середній, переважно асиметричний. Поверхня - гладенька. Основний колір шкірки - світло-оранжевий. М'якоть оранжева, проміжна, тверда. Зростання кісточки із м'якоттю відсутнє. Кісточка витягнута. Сорт ранній. Листок восени - червонувато-жовтий.

*За даними заявника: урожайність товарна 150 (ц/га), урожай з дерева 54 (кг) Зимостійкість 7 балів, стійкість до посухи 7 балів, ураженість хворобами, балів: моніліальним опіком- 5; клястероспоріозом - 5. Вміст сухої речовини в плодах - 19,1%, вміст загального цукру - 13,3%, загальна кислотність -1,16%. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника

® 10070001 Южанін

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево слабросле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона сильне. Сочевичок на однорічному пагоні середня кількість. Листкова пластинка велика, помірною зеленню забарвлення з верхньої сторони. Основа листка звужена, верхівка – подовжено-загострена. Краї - хвилясті. Черешок середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід середній, округлий, переважно симетричний, основний колір шкірки - оранжевий. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки сильна. М'якоть оранжева, структура - проміжна, тверда. Кісточка округла. Час початку цвітіння – середній. Час досягання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 129 (ц/га), урожай з дерева 31,0 (кг), маса плоду 48,0 (г). Вміст загального цукру - 7,7 %, вітаміну С - 4,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість та посухостійкість 6 балів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

® 10070002 Ялтінець

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево сильноросле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Сочевичок на однорічному пагоні багато. Листкова пластинка середня, помірною зеленню забарвлення з верхньої сторони. Основа листка зрізана, верхівка – подовжено-загострена. Надрізи з краю - двічізубчасті. Черешок короткий. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки помірна з рум'янцем, основний колір – світло-оранжевий. М'якоть світло-оранжева, структура - проміжна, середньої твердості. Кісточка мала, подовжена, ступінь зростання кісточки із м'якоттю - слабка. Час початку цвітіння – середній. Час досягання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 125 (ц/га), урожай з дерева 41,0 (кг), маса плоду 52,0 (г). Вміст загального цукру – 9,1 %, вітаміну С – 5,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість 7, посухостійкість 8,5 балів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

Алича (слива розлога)

® 10072001 Десертна Раня

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньо росле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, помірно зеленого забарвлення. З верхнього боку глянуватість слабка, з нижнього – помірно опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини, опушення верхнього боку слабе, борозенка - середня. Квітконіжка довга. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка розташовані вільно. Пелюстка - оберненояйцевидна, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - середня. Основне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть жовта з помірною щільністю та соковитістю. Кісточка середня, округло-еліптична, поверхня - зерниста. Час початку цвітіння - середній. Строк досягання плодів - середній.

* Дані заявника.