

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево слабросле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона сильне. Сочевичок на однорічному пагоні середня кількість. Листкова пластинка велика, помірного зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа листка звужена, верхівка – подовжено-загострена. Краї - хвилясті. Черешок середній. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід середній, округлий, переважно симетричний, основний колір шкірки - оранжевий. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки сильна. М'якоть оранжева, структура - проміжна, тверда. Кісточка округла. Час початку цвітіння – середній. Час достигання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 129 (ц/га), урожай з дерева 31,0 (кг), маса плоду 48,0 (г). Вміст загального цукру - 7,7 %, вітаміну С - 4,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість та посухостійкість 6 балів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

® 10070002 Ялтiнец

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево сильноросле, розлоге. Антоціанове забарвлення верхівки молодого пагона помірне. Сочевичок на однорічному пагоні багато. Листкова пластинка середня, помірного зеленого забарвлення з верхньої сторони. Основа листка зрізана, верхівка – подовжено-загострена. Надрізи з краю - двічізубчасті. Черешок короткий. Квітка середнього розміру. Пелюстка – широко-еліптична. Плід великий, переважно симетричний. Поверхня гладенька. Інтенсивність антоціанового забарвлення шкірки помірна з рум'янцем, основний колір – світло-оранжевий. М'якоть світло-оранжева, структура - проміжна, середньої твердості. Кісточка мала, подовжена, ступінь зростання кісточки із м'якоттю - слабка. Час початку цвітіння – середній. Час достигання плодів – середньопізній.

*За даними заявника: урожайність товарна 125 (ц/га), урожай з дерева 41,0 (кг), маса плоду 52,0 (г). Вміст загального цукру – 9,1 %, вітаміну С – 5,6 мг%. Дегустаційна оцінка 7 балів. Зимостійкість 7, посухостійкість 8,5 балів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ.

* Дані заявника

Алича (слива розлога)

® 10072001 Десертна Рання

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньо росле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, помірно зеленого забарвлення. З верхнього боку гляндуватість слабка, з нижнього – помірно опушена. Край листкової пластинки городчастий. Черешок середньої довжини, опушення верхнього боку слабе, борозенка - середня. Квітконіжка довга. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка розташовані вільно. Пелюстка - оберненояйцевидна, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, округлий, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - середня. Основне забарвлення плоду фіолетово-синє. М'якоть жовта з помірно щільністю та соковитістю. Кісточка середня, округло-еліптична, поверхня - зерниста. Час початку цвітіння - середній. Строк достигання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 170,0 ц/га, середній урожай з дерева – 25,5 кг, середня маса плоду – 31,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – середня. Стійкість проти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,5%, вітаміну С – 9,3 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність – 8,5 балів. Сорт середнього строку достигання. Напрямок використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 07072002 Рум'яна Зорька

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньо росле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, притиснута до пагона. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, темно зеленого забарвлення. З верхнього боку глянуватість помірна, з нижнього - слабо опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабе, борозенка - середня. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні, середі, пелюстки віночка доторкаються. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, слабохвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - середня. Основне забарвлення плоду жовте. М'якоть жовта, щільна та соковита. Кісточка мала, округло-еліптична, поверхня - дрібнозерниста. Час початку цвітіння - пізній. Строк достигання плодів - пізній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність – 140,0 ц/га, середній урожай з дерева – 50,5 кг, середня маса плоду – 43,0 г. Зимостійкість та посухостійкість – 5-7 балів. Стійкість проти моніліозу середня. Вміст загального цукру – 9,7%, вітаміну С – 6,0 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність – 8,5 балів. Сорт пізнього строку достигання.

Напрямок використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 07072001 Феміда

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Заявник – Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр.

*Дерево середньоросле. Крона - помірно щільна. Положення однорічної гілки - напіввертикальне. Вегетативна брунька мала, конічна, злегка відхилена. Листок спрямований догори стосовно пагона. Листкова пластинка еліптична, з гострим кінчиком, світло зеленого забарвлення. З верхнього боку глянуватість слабка, з нижнього - слабо опушена. Край листової пластинки городчастий. Черешок короткий, опушення верхнього боку відсутнє або дуже слабе, боріздка - мілка. Квітконіжка середньої довжини. Квітки на однорічних гілочках наявні. Квітка мала, пелюстки віночка доторкаються. Чашолисток - овальний. Пелюстка - обернено-широко-еліптична, хвиляста. Приймочка маточки розташована вище пиляків. Плід великий, овальний, симетричний. Верхівка - плеската, лійка - мілка. Основне забарвлення плоду темно-синє. М'якоть жовта, помірно щільна та соковита. Кісточка середнього розміру, округло-еліптична, поверхня - дрібнозерниста. Час початку цвітіння - пізній. Строк достигання плодів - середній.

* Дані заявника.

*За даними заявників: середня врожайність - 192,0 ц/га, середній урожай з дерева – 57,7 кг, середня маса плоду – 38,0 г. Зимостійкість та посухостійкість - 5 балів. Моніліальним опіком уражується слабо. Вміст загального цукру – 10,4%, вітаміну С – 10,8 мг%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 8,1 балів. Транспорتابельність - 9 балів. Сорт середнього строку достигання.

Напрямок використання - універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.