Cren

\* Дані заявника

® 07079018 Стрелец

Нікітський ботанічний сад - Національний наукоми центр Умраїнської академії аграрних наук

Ветеран х Арт.

твердості. Смак – помірний, кисло-солодкий. Кісточка округла, боріздчата. Здатність до розтріскування слабка. Наявне сильне зростання 'Дерево середньоросле, напівпряме. Квітковий пагін середньої довжини та товщини. Генеративні бруньки подвійні. Квітка яскрава. Листкова пластинка середня, зелена. Черешок короткий, нектарники ниркоподібної форми. Плід середній, округлий, симетричний. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, округлої форми. Зав'язь опушена. Основне забарвлення – жовте, поверхневе - темно-червоне. Плід опушений. Шкірка середньої товщини. М'якоть жовта, середньої кісточки із м'якоттю. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання дуже слабка.

За даними заявника: середня урожайність 200,0 ц/га, урожай з дерева 30,0 (кг), маса плоду 85,0 (г). Вміст сухої речовини в плодах 13,7%, загального цукру 7,71%, вітаміну С 13,4 мг%. Загальна кислотність 0,49%. Напрям використання – універсальний. Транспортабельність

\* Дані заявника

## 07079011 Темісовський

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка середнього розміру, зелена. Черешок листка середньої довжини, нектарники ниркоподібної яскрава (дзвоникоподібна). Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, малого розміру, вузько-еліптичної форми. Плід середнього розміру, еліптичної форми, симетричний. Основне забарвлення – жовте, поверхневе червоне. Опушення густе. Шкірка товста. М'якоть жовта, тверда. Солодкий смак слабкий, кислий помірний. Кісточка еліптична, ямкувато-боріздчата. Здатність до 'Дерево високоросле, напівпряме. Квітковий пагін товстий, міжвузля середні. Генеративні бруньки розміщені по дві і більше. Квітка не розтріскування відсутня або дуже слабка. Зростання кісточки із м'якоттю помірне. Сорт середньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання помірна.

\* За даними заявника: середня урожайність 246 ц/га, урожай з дерева 37 (кг). Вміст сухої речовини в плодах 16,1%, загального цукру 12,3%, вітаміну С 9,8 мг%. Загальна кислотність 0,5%. Зимостійкість 3 бали. \*Дані заявника

## 07079016 Юбілейний Ранній

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Ветеран х Фаворіт Моренттіні.

форми. Зав'язь опушена. Листкова пластинка довга, широка, зелена. Черешок середньої довжини, нектарники ниркоподібної форми. Плід середньої товщини. М'якоть жовта, тверда. Смак – помірний. кисло-солодкий. Кісточка еліптична, ямкувата. Здатність до розтріскування дзвоникоподібна. Внутрішня сторона чашечки - оранжева. Віночок рожевий. Пелюсток п'ять, середнього розміру, широко-еліптичної слабка. Наявне сильне зростання кісточки із м'якоттю. Сорт ранньостиглий. Здатність урожаю до передчасного обсипання слабка. середній, округлий, симетричний. Основне забарвлення – зеленувато-жовте, поверхневе - темно-червоне. Плід опушений. Шкірка 'Дерево середнє, сильноросле, розлоге. Квітковий пагін середньої довжини та товщини. Генеративні бруньки подвійні. Квітка

За даними заявника: середня урожайність 168,0 ц/га, урожай з дерева 25,2 (кг), маса плоду 120 (г). Дегустаційна оцінка 8,5 балів. Вміст сухої речовини в плодах 13,0%, загального цукру 12,5%, вітаміну С 12,4 мг%. Загальна кислотність 0,6%. Напрям використання –

Cren

Степ

універсальний. Транспортабельність висока. \* Дані заявника

## Жимолость синя

Лісостеп

## ® 09341001 Aniciя

Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

товщина шкірки середня, м'якоть волокниста, ніжна, смак кисло-солодкий, гіркота відсутня. Час початку цвітіння пізній, час достигання слабке. Квітка середнього розміру, приквітки листоподібні. Плоди середні з помірним восковим нальотом, еліптичниі, фіолетово-сині, \* Кущ низький. Пагони світло-зелені, прямі, довгі, опушення слабке. Листки середні, яйцевидні, світло-зеленого кольору, опушення Відбірний сіянець від вільного запилення жимолості камчатської. ягід від середнього до пізнього.

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 5,0 т/га. Середня маса ягоди – 1,0 г, максимальна – 1,1 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – середньо-пізня. Напрям використання - універсальний.

Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп.

\* Дані заявника.

09341002 Спокуса

Краснокутський науково- дослідний центр садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

Лісостеп

Заявник:

слабке. Квітка мала, приквітки шилоподібні. Плоди середні з помірним восковим нальотом, веретеноподібний, фіолетово-синій, товщина шкірки середня, м'якоть щільна, середньої консистенції, смак -солодкий, гіркота відсутня. Час початку цвітіння середній, час достигання \* Кущ середньорослий. Пагони буро-зелені, прямі, короткі, опушення слабке. Листки середні, ланцетні, зеленого кольору, опушення Відбірний сіянець від вільного запилення жимолості камчатської. ягід середній.

максимальна – 1,23 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – середня. Напрям використання - унівесальний. Рекомендована За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 5,2 т/га. Середня маса ягоди – 1,06 г, грунтово-кліматична зона – Лісостеп. Лісостеп

4 Дані заявника.

® 08341001 Чайка

Інститут помології ім. Л.П. Симиренка Української академії аграрних наук

Заявник:

\* Кущ середньо рослий. Пагони зелені, вигнуті, середньої довжини, опушення відсутнє. Листки середні, овальні, темно-зеленого кольору, опушення відсутнє. Квітка середнього розміру, приквітки листоподібні. Плоди великі з помірним восковим нальотом, еліптичні, блакитні, товщина шкірки середня, м'якоть щільна, середньої консистенції, смак кисло-солодкий, гіркота слабка. Час початку цвітіння середній,

За даними заявника за схеми садіння 3 х 1,0 м середня врожайність рослин сорту становить 3,25 т/га. Середня маса ягоди – 1,150 г, максимальна – 1,25 г. Сорт зимо- і посухостійкий. Група стиглості – рання. Рекомендована грунтово-кліматична зона – Лісостеп. час достигання ягід від ранній.

Дані заявника.