

09084003 Радославка

Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплюснена, середньощільна, середньоросла. Листя зелене з верхнього боку, пухирчастість слабка, блиск сильний. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів середня кількість, опушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середня. Чашечка менша від віночка. Пелюстки віночка головної квіткі дотикаються. Плід великий, переважно конічної форми. Різниці за формою між плодами першого і другого року помірні. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка заглиблені в плід. М'якоть білувато-рожевого забарвлення, твердість помірні. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

За даними заявника середня маса ягоди – 11,2 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся

* Дані заявника.

09084002 Стефанія

Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплюснена, щільна, сильноросла. Листя ясно-зелене з верхнього боку, пухирчастість помірні, блиск помірний. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку злегка відхилені. Вусів багато, слабоопушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на під листками. Квітка велика. Чашечка більша від віночка. Пелюстки віночка головної квіткі перекиваються. Плід середній, переважно конічної форми. Різниці за формою між плодами першого і другого року помірні. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, рівномірне, із помірним блиском. Зернятка урівень з плодом. М'якоть червоного забарвлення, тверда. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

* За даними заявника середня урожайність з куща 0,8 кг, маса ягоди – 10,8 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся

* Дані заявника.

Горіх грецький

® 10075002 Карлик 5

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Відбір серед сіянців.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкобугорчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірні. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час досягання маси раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.