

09084003 Радославка

Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплюснена, середньощільна, середньоросла. Листя зелене з верхнього боку, пухирчастість слабка, блиск сильний. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку сильно відхилені. Вусів середня кількість, опушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на рівні листків. Квітка середня. Чашечка менша від віночка. Пелюстки віночка головної квіткі дотикаються. Плід великий, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, злегка нерівномірне, із сильним блиском. Зернятка заглиблені в плід. М'якоть білувато-рожевого забарвлення, твердість помірна. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

За даними заявника середня маса ягоди – 11,2 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся

* Дані заявника.

09084002 Стефанія

Лісостеп, Полісся

Заявник: Львівська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Української академії аграрних наук

* Рослина кулясто-сплюснена, щільна, сильноросла. Листя ясно-зелене з верхнього боку, пухирчастість помірна, блиск помірний. Краї листків зубчасті. Волоски на черешку злегка відхилені. Вусів багато, слабоопушені, антоціанове забарвлення сильне. Суцвіття розташоване на під листками. Квітка велика. Чашечка більша від віночка. Пелюстки віночка головної квіткі перекиваються. Плід середній, переважно конічної форми. Різниця за формою між плодами першого і другого року помірна. Зона вільна від зерняток відсутня або дуже мала. Забарвлення плоду червоне, рівномірне, із помірним блиском. Зернятка урівень з плодом. М'якоть червоного забарвлення, тверда. Повітряна комірка відсутня або дуже мала.

* За даними заявника середня урожайність з куща 0,8 кг, маса ягоди – 10,8 г. Сорт зимостійкий - 9 балів. Стійкість до ураженості шкідниками та пошкодження хворобами 8-9 балів. Група стиглості - рання. Напрям використання – десертний, можливе заморожування.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп, Полісся

* Дані заявника.

Горіх грецький

® 10075002 Карлик 5

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Відбір серед сіянців.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкобріздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час досягання маси раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 40,6 ц/га. Середня маса плоду – 10,5 г, максимальна – 15,2 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075003 Карлик 3

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Відбір серед сіянців.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа тонка, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, середнє, відсоткове відношення до загальної маси горіха середнє. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 50,0 ц/га. Середня маса плоду – 12,0 г, максимальна – 14,7 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075001 Подарунок Валентини

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

*Невідоме схрещування.

Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх дуже великий, форма у повздовжньому перерізі трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, дуже велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 82 ц/га. Середня маса плоду – 27,5 г, максимальна – 32,3 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075004 Пурпуровий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Невідоме схрещування.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх великий, форма у повздовжньому перерізі яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа середньої товщини, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання ранній. Оплідень повністю обпадає.