

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 40,6 ц/га. Середня маса плоду – 10,5 г, максимальна – 15,2 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075003 Карлик 3

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Відбір серед сіянців.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх середнього розміру, форма у повздовжньому перерізі широко-трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа тонка, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, середнє, відсоткове відношення до загальної маси горіха середнє. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 50,0 ц/га. Середня маса плоду – 12,0 г, максимальна – 14,7 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075001 Подарунок Валентини

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

*Невідоме схрещування.

Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх дуже великий, форма у повздовжньому перерізі трапецієвидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, товщина шкарлупи середня, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, дуже світле, дуже велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання між раннім і середнім. Оплідень повністю обпадає.

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 82 ц/га. Середня маса плоду – 27,5 г, максимальна – 32,3 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – ранньо-середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10075004 Пурпуровий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Невідоме схрещування.

* Дерево слабросле, напівпрямостояче. Генеративні бруньки розміщені переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2-х років. Час розпукування вегетативних бруньок та цвітіння чоловічих та жіночих квіток між раннім і середнім. Річний пагін – зелено-коричневий. Горіх великий, форма у повздовжньому перерізі яйцевидна. Структура поверхні шкарлупи слабкоборіздчаста, шкарлупа середньої товщини, міцність з'єднання двох половинок помірна. Ядро легко видаляється з шкарлупи, велике, відсоткове відношення до загальної маси горіха велике. Час достигання ранній. Оплідень повністю обпадає.