

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 68,8 ц/га. Середня маса плоду – 15,0 г, максимальна – 17,4 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Мигдаль звичайний

10215002 Боспор

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий x Туопо.

Дерево за силою росту помірне, розлоге. Однорічний пагін середньої товщини зі слабким антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середня, темно-зеленого кольору, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – коричнево-зелене. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка середнього розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середньої стиглості до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою широко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,4 кг, середня маса плоду – 2,6 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз – 4, сіра плодова гниль – 3 бали. Вихід ядра – 34,8%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

10215001 Олександр

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий x Туопо.

Дерево за силою росту помірне, пряме. Однорічний пагін середньої товщини з помірним антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середньої ширини, коротка, темно-зеленого забарвлення, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – червоно-коричневе. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка малого розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середньої стиглості до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою широко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,5 кг, середня маса плоду – 1,7 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз, сіра плодова гниль – 4 бали. Вихід ядра – 41,9%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Унабі справжній (зізіфус)

® 10124002 Сініт

Степ