

За даними заявника за схеми садіння 6 x 4 м середня врожайність становить 68,8 ц/га. Середня маса плоду – 15,0 г, максимальна – 17,4 г. Посухостійкий, зимостійкість середня. Стійкість проти хвороб та шкідників – 7-9 балів. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Мигдаль звичайний

10215002 Боспор

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий х Туопо.

Дерево за силою росту помірне, розлоге. Однорічний пагін середньої товщини зі слабким антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середня, темно-зеленого кольору, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – коричнево-зелене. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка середнього розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середньої стиглості до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою широко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,4 кг, середня маса плоду – 2,6 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз – 4, сіра плодова гниль – 3 бали. Вихід ядра – 34,8%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

10215001 Олександр

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

*Винослівий х Туопо.

Дерево за силою росту помірне, пряме. Однорічний пагін середньої товщини з помірним антоціановим забарвленням. Листкові бруньки розпускаються одночасно з початком цвітіння. Листкова пластинка середньої ширини, коротка, темно-зеленого забарвлення, надрізи з країв городчасті. Генеративні бруньки розміщені переважно на плодушках, конічної форми, забарвлення верхівок пелюсток рожево-біле, чашолистків – червоно-коричневе. Час початку цвітіння дуже пізній. Квітка малого розміру, форма пелюсток еліптична, забарвлення рожево-біле, тичинок середня кількість, маточок інколи дві. Недостиглий плід середнього розміру, яйцеподібної форми. Час досягання середньої стиглості до розтріскування сухого плоду помірна. Ядро за формою широко-еліптичне, середнього розміру, жовто-коричневе.

* За даними заявника за схеми садіння 7 x 6 м середній урожай з дерева – 8,5 кг, середня маса плоду – 1,7 г. Посухостійкість та зимостійкість 5 балів. Стійкість проти хвороб: клястероспоріоз, сіра плодова гниль – 4 бали. Вихід ядра – 41,9%. Група стиглості – середня.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Унабі справжній (зізіфус)

® 10124002 Сініт

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Мутація сорту Кітайській 60.

* Дерево середньоросле, напіврозлоге, колючки наявні. Однорічний пагін середній, бурий. Плодоносний пагін, середній, кремувато-зелений. Квітка середнього розміру. Плід малий, еліптичний, коричневого забарвлення. М'якоть біло-зелена, тверда. Кісточка мала, вузько-еліптична, жовто-коричнева.

За даними заявника за схеми садіння 5 x 5 м середня врожайність становить 130,0 т/га. Середня маса плоду - 5,0 г, максимальна - 6,0 г. Група стиглості - рання. Дегустаційна оцінка 4,8 балів. Напрям використання - споживання у свіжому вигляді, технічна переробка. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

® 10124001 Цукерковий

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Мутація сорту Я-цзао.

* Дерево слабросле, пряме, колючки відсутні. Однорічний пагін короткий, бурий. Плодоносний пагін, короткий - кремувато-зелений. Квітка середнього розміру. Плід малий, еліптичний, темно-коричневого забарвлення. М'якоть біло-зелена, тверда. Кісточка мала, вузько-еліптична, жовто-коричнева.

За даними заявника за схеми садіння 4 x 4 м середня врожайність становить 160,0 ц/га. Середня маса плоду - 5,0 г, максимальна - 6,5 г. Група стиглості - рання. Дегустаційна оцінка 5 балів. Напрям використання - споживання у свіжому вигляді, технічна переробка.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона - Степ.

* Дані заявника.

Ліщина велика (Фундук)

Лісостеп, Полісся

09216002 Барселонський

Заявник: Михаць Остап Романович

* Рослина сильноросла, розлога. Кореневих паростків середня кількість. Однорічний пагін товстий, слабоопушений, листкова пластинка зеленого кольору. Чоловіче суцвіття довге, зеленого кольору. Час цвітіння чоловічих та жіночих квіток від раннього до середнього. Час Плід великого розміру, світло-коричневий, короткий, кулястої форми. Ядро велике, яйцеподібне, зовнішня шкіра сильно закорковіла. Час достигання середній. Відсоток ядра за масою малий.

* За даними заявника середня урожайність 15 ц/га, середній урожай з дерева 3-4 кг, маса плоду 2,9 г, максимальна 4,5 г. Зимостійкість висока та посухостійкість середня. Вихід ядра 40%. Твердість шкарлупи 5 балів, виповненість горіха 7 балів.

* Дані заявника.

09216003 Галле

Заявник: Михаць Остап Романович

* Рослина сильноросла, розлога. Кореневих паростків утворює мало. Однорічний пагін середньої товщини, сильно опушений, листкова пластинка червоного кольору. Чоловіче суцвіття середньої довжини, рожево-коричневого кольору. Приймочка фіолетова. Час цвітіння чоловічих та жіночих квіток пізній. Плід конічної форми, великого розміру, світло-коричневий. Ядро велике, яйцеподібної форми, зовнішня шкіра незакорковіла або дуже слабкозакорковіла. Час достигання пізній. Відсоток ядра за масою дуже малий.

Лісостеп, Полісся