

* За даними заявника середня урожайність 15 ц/га, середній урожай з дерева 3-4 кг, маса плоду 4 г, максимальна 4,7 г. Зимостійкість висока, посухостійкість середня. Вміст жиру – 53,1 %, вміст білку – 20,8%. Вихід ядра 37-40%. Твердість шкарлупи 9 балів, виповненість горіха 9 балів.

* Дані заявника.

09216001 Косфорд

Заявник: Михаць Остап Романович

Лісостеп, Полісся

* Рослина сильноросла, пряма. Кореневих паростків утворює мало. Однорічний пагін тонкий, слабоопушений, листкова пластинка зеленого кольору. Чоловіче суцвіття довге, рожево-коричневого кольору. Приймочка фіолетова. Час цвітіння чоловічих квіток від середнього до пізнього, жіночих – пізній. Плід великого розміру, світло-коричневий, короткий майже циліндричної форми. Ядро велике, короткоциліндричної форми, зовнішня шкіра сильнозакорковіла. Час досягання від середнього до пізнього. Відсоток ядра за масою дуже великий.

* За даними заявника середня урожайність 16 ц/га, середній урожай з дерева 3,2-4,5 кг, маса плоду 2,1 г, максимальна 3,4 г. Зимостійкість висока та посухостійкість висока. Вихід ядра 57%. Твердість шкарлупи 3 бали, виповненість горіха 5 балів.

* Дані заявника.

Айва х яблуня

® 03411001 УУПРОЗ-6

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

* Міжвидовий гібрид напівкультурної форми айви х суміш пилку яблуні сортів: Антонівки, Кальвіля снігового, Мекінтоша. Дерево помірної сили росту, з розлогою формою крони. Тип плодоношення – на коротких пагонах. Однорічний пагін помірно опушений у верхній половині. Міжвузля середнє. Квітка велика, жовтава і рожева. Пелюстки доторкуються одна до одної. Листкова пластинка середня. Краї рифлені. Плід дуже малий, жовто – зелений, ребристий, восковий наліт відсутній або дуже слабкий. М'якуш дуже твердий, зеленуватий. Насінні комірці цілком відкриті. Час початку цвітіння та збиральної стиглості дуже пізній.

Плоди не їстівні і не придатні для технічної преробки. Напряма використання – підщепа яблуні, груші, айви, глоду, хеномелесу.

Зимостійкість середня, посухостійкість слабка. Група стиглості - пізньоосіння

* Дані заявника.

Хурма східна

® 10442003 Золотиста

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Тріумф х Українка

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Степ

Середня врожайність становить 333,3 т/га. Середня маса плоду 218,5 г, максимальна – 291,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 10442005 Зірочка

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Батумський ІІ х Фуйю

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тула, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 22,08 т/га. Середня маса плоду 155,7 г, максимальна – 234,2 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 10442001 Мрія

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Куго Кума х Fuji

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) червоно-коричневий, довгий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тула, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – неправильно-овальний, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші інколи присутні. В'яжуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром велике, вузько-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативних бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 458,3 т/га. Середня маса плоду 240,5 г, максимальна – 287 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 09442002 Нікітська бордова

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Росіянка х вільне запилення.

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тула, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід малий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – червоно-оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина завжди

Степ

Степ

Степ