

Середня врожайність становить 333,3 т/га. Середня маса плоду 218,5 г, максимальна – 291,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

\* Дані заявника.

## ® 10442005 Зірочка

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Батумський ІІ х Фуйю

\* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напіввидовжене, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 22,08 т/га. Середня маса плоду 155,7 г, максимальна – 234,2 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

\* Дані заявника.

## ® 10442001 Мрія

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Куго Kuma x Fuji

\* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) червоно-коричневий, довгий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – неправильно-овальний, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші інколи присутні. В'яжуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром велике, вузько-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативних бруньок пізній, час споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 458,3 т/га. Середня маса плоду 240,5 г, максимальна – 287 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

\* Дані заявника.

## ® 09442002 Нікітська бордова

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Степ

Росіянка х вільне запилення.

\* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр віничка жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід малий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – червоно-оранжеве, забарвлення м'якуша – червоно-оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'яжуча речовина завжди