

наявна. Насіння за розміром – середнє, напівшироко-еліптичне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 29,1 т/га. Середня маса плоду 115 г, максимальна – 130 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 10442004 Південна красуня

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Shogatsu

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, маленькі, еліптичні. Листкова пластинка довга, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід середній, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжево-червоне, забарвлення м'якуша – оранжево-червоне, коричневі плямки на м'якуші завжди відсутні. В'язуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром середнє, широко-яйцеподібне, темно-коричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок, споживчої стиглості – середній.

Середня врожайність становить 350,0 т/га. Середня маса плоду 150,0 г, максимальна – 165,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 09442001 Росіянка

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Diospyros virginiana L. x * Diospyros kaki L.

* Дерево сильноросле, напівпрямостояче. Однорічний пагін (з під сонячного боку) сіро-коричневий, довгий з середньою довжиною міжвузля, сочевичок багато, середнього розміру, видовжені. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – жіночі і чоловічі. Діаметр вінчика жіночої квітки – малий, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – більше чотирьох. Плід середнього розміру, стиснутий, неправильно-овальний, забарвлення шкірочки – жовто-оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші відсутні. В'язуча речовина завжди наявна. Насіння за розміром – мале, широко-яйцеподібне, помірнокоричневе. Час цвітіння, розкриття вегетативних бруньок та споживчої стиглості – пізній.

Середня врожайність становить 35,42 т/га. Середня маса плоду 97 г, максимальна – 125 г. Сорт зимостійкий, посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 10442002 Сувенір осені

Степ

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Nashia x Fuyu.

* Дерево середньоросле, за габітусом розлоге. Однорічний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, з коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середнього розміру, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – лише жіночі. Діаметр вінчика жіночої квітки – середній, форма чашечки – ромбічна,

кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід великий, стиснутий, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки на м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напівдовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок пізній, час споживчої стиглості – ранній.

Середня врожайність становить 41,67 т/га. Середня маса плоду 197,0 г, максимальна – 230,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 10442006 Українка

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Тсуру Нoko

* Дерево середньоросле, за габітусом напівпрямостояче. Одрісний пагін (з під сонячного боку) жовто-коричневий, середній, 3 коротким міжвузлям, сочевичок декілька, середні, еліптичні. Листкова пластинка середня, за формою еліптична, форма основи – тупа, форма верхівки – гостра. Прояв статі квіток дерева – жіночі і чоловічі. Діаметр віничка жіночої квітки – середній, форма чашечки – ромбічна, кількість пелюсток віночка – понад чотири. Плід середній, еліптичний, за основною формою у поперечному розтині – округлий, забарвлення шкірочки – оранжеве, забарвлення м'якуша – оранжеве, коричневі плямки у м'якуші завжди наявні. В'яжуча речовина завжди відсутня. Насіння за розміром велике, напівдовжене, темно-коричневе. Час цвітіння і розкриття вегетативний бруньок – пізній, час споживчої стиглості – ранній.

Середня врожайність становить 34,38 т/га. Середня маса плоду 95,0 г, максимальна – 115,0 г. Зимостійкість та посухостійкість середня, ураженість паршею – відсутня або слабка. Дегустаційна оцінка 5 балів.

* Дані заявника.

® 05465001 Афродіта

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

Гріот Остгеймський х Валерій Чкалов.

* Дерево помірної сили росту, напіврозлоге, помірно розгалужене. На молодому пагоні антоціанове забарвлення помірне, опушення слабе, сочевичок мало. Листкова пластинка середньої довжини та ширини, із темно зеленим забарвленням верхнього боку. Черешок середньої довжини. Запозки наявні. Квітка велика, з округлими пелюстками, що дотикаються. Плід великий, плоско-кулястий, шкірка та м'якоть темно-червоного забарвлення. Сік помірно-червоний. Плід середньої пружності, солодкий, кислотність помірна, соковитий. Кісточка середнього розміру, округлої форми. Час цвітіння середній. Плоди достигають дуже рано.

* За даними заявника: урожайність товарна 83,42 т/га, урожай з дерева 30,0 (кг), маса плоду 6,0 (г), дегустаційна оцінка 4,8 балів.

Зимостійкість та посухостійкість висока. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп. Напрям використання – універсальний. * Дані заявника

08482001 Насолода

Заявник:

Національний університет біоресурсів і природокористування

Ожина звичайна

Лісостеп