

Частково відоме схрещування Тріпл Крови, Торнфрі.

* Рослина за габітусом напівпрямма, нових пагонів мало. Пагін у стані спокою за довжиною середній, антоціанове, забарвлення помірне, колючки відсутні. Листок непарно перистий. Колір пелюсток квітки білий. Ягода велика, еліптична, чорна. Початок цвітіння ранній, достигання середній.

За даними заявника за схеми садіння 3,0 x 1,5 м середня врожайність рослин сорту становить 16,7 т/га. Середня маса ягоди – 3,6 г, максимальна – 4,7 г. Зимостійкість – 3, посухостійкість – 8 балів. Група стиглості – середньо-пізня. Напряма використання – універсальний. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп.

* Дані заявника.

Виноград

Виноград справжній

® 10073002 Лівія

Заявник:

Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

* Сорт столовий. Має 110 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються рано. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті. Верхній бік пластинки молодого листка зелений із антоціановими плямами. Положення пагона у просторі напівпряме. Вусики середні, послідовних вусиків менше трьох. Квітка має добре розвинені тичинки і редуковану маточку.

Розвинений листок великий, п'ятикутний, з п'ятьма лопатями. Листкові вирізи між лопатями неглибокі. Зубці розвиненого листка середньої довжини, обидва боки випуклі. Початок достигання ягід дуже ранній. Гроно велике, середньої щільності, ніжка середня. Ягода дуже велика, тупо-яйцеподібна, колір шкірки без воскового нальоту – рожевий, важко відокремлюється від плодоніжки. Товщина шкірки середня. М'якоть соковита, тверда. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін жовтувато-коричневий, гладенький.

Сорт ранньостиглий, столового призначення. Стійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, слабостійкий до філоксери. Середня

врожайність – 168 ц/га, середня маса гроно – 580 г, середня маса 100 ягід – 620 г. Цукристість – 18,8 %, кислотність – 6,2 г/л. Вихід соку (сусла) – 60 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано вирощувати у всіх виноградарських зонах України.

* Дані заявника.

® 10073001 Південнобережний

Заявник:

Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

* Сорт столовий. Має 136 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів повністю відкриті. Верхній бік пластинки молодого листка жовто – зелений. Положення пагона у просторі напівпряме. Вусики короткі, послідовних вусиків менше трьох. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок великий, сецевидний, з п'ятьма лопатями. Листкові вирізи між лопатями глибокі. Зубці розвиненого листка середньої довжини, обидва боки випуклі. Початок достигання ягід середній. Гроно середнього розміру, середньої щільності, ніжка коротка. Ягода середня, еліптична, колір шкірки без воскового нальоту – фіолетово-червоний, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Товщина шкірки середня. М'якоть соковита, тверда. Насіння рудиментарне. Здерев'янілий пагін темно-коричневий, борозечастий.

Сорт середньостиглий столового призначення. Стійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, середня стійкість до філоксери. Середня врожайність – 150 ц/га, середня маса гроно – 253 г, середня маса 100 ягід – 325 г. Цукристість – 18,4 %, кислотність – 7,3 г/л. Вихід соку (сусла) – 60 %. Зимостійкість середня. Рекомендовано вирощувати у всіх виноградарських зонах України.

* Дані заявника.

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп