

Декоративні та лікарські Астильба

® 10348004 Анюта

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

- * Рослина за вистою середня. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянуватість верхнього боку сильна. Суцвіття волотеподібне, середньої висоти, дуже широке, пухке, біло-рожевого кольору. Початок цвітіння середній. Тривалість цвітіння середня.
- * Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп.
- * Дані заявника.

® 10348003 Лебідонька

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

- * Рослина за вистою середня. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянуватість верхнього боку слабка. Суцвіття поникле, середньої висоти, середнього діаметру, щільне, білого кольору. Початок цвітіння дуже ранній. Тривалість цвітіння середня.
- * Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп.
- * Дані заявника.

® 10348002 Оченята

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

- * Рослина низька. Листок помірно зеленого забарвлення, краї сегментів бурі, глянуватість верхнього боку слабка. Суцвіття ромбічне, середньої висоти, вузьке, щільне, біло-рожевого кольору. Початок цвітіння середній. Тривалість цвітіння середня.
- * Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп.
- * Дані заявника.

® 10348001 Хурделиця

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

- * Рослина висока. Листок помірно зеленого забарвлення, глянуватість верхнього боку слабка. Суцвіття поникле, середньої висоти, широке, помірно щільне, білого кольору. Початок цвітіння ранній. Тривалість цвітіння середня.
- * Зимостійкість, стійкість до хвороб та шкідників – 9 балів. Період від початку цвітіння до втрати декоративності 9 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Лісостеп.
- * Дані заявника.

10285002 Ангеліна

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

Калістефус китайський

Степ, Лісостеп, Полісся

Невідоме схрещування.

*Сортогрупа принцеса. Час початку цвітіння ранній. Рослини за висотою високі, колоноподібні, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка слабка. Суцвіття сферичне, дуже повне, щільне, мале, темно-синє. Язичкова квітка лопаточкоподібна, коротка, горизонтальна, загострена. Трубочаста квітка довга. Насіння антоціаново-коричневе, вузькоклиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, стійкість квіток за зрізування 2 тижні. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

4 09285002 Весільна

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Частково відоме схрещування Дарунок матері.

*Сортогрупа художня. Час початку цвітіння середній. Рослини за висотою дуже високі, колоноподібної форми, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок відсутнє. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка помірна. Суцвіття сферичне, повне, середньої щільності, середнього діаметру, світле синьо-фіолетове. Язичкова квітка стрічкоподібна, середня, горизонтальна. Трубочаста квітка коротка. Насіння сірувато-коричневе, вузькоклиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 40 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

® 09285001 Сва

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Частково відоме схрещування Унікум (мікс).

* Сортогрупа унікум. Час початку цвітіння пізній. Рослини за висотою середні, колоноподібні, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження середнє. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня. Наявне антоціанове забарвлення листка та помірна опушеність. Суцвіття сферичне, повне, середньої щільності, середнього діаметру, темне пурпурово-червоне. Язичкова квітка стрічкоподібна, середня, горизонтальна. Трубочаста квітка коротка. Насіння сірувато-коричневе, вузькоклиноподібне.

* За даними заявника стійкість проти хвороб і шкідників 9 балів. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 50 днів. Рекомендовані ґрунтово-кліматичні зони – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

10285001 Оксамит

Заявник: Інститут садівництва Української академії аграрних наук

*Сортогрупа хризантемovidна. Час початку цвітіння ранній. Рослини за висотою середні, овальної форми, антоціанове забарвлення головного стебла і гілок наявне. Галуження сильне. Наявні квітконоси 2-го і 3-го порядків. Залистяність середня, опушеність листка помірна. Суцвіття опукле, дуже повне, щільне, великого діаметру, червоне. Язичкова квітка трубчаста, довга, загострена догори. Трубочаста квітка довга. Насіння сірувато-сріблясто-жовте, вузько клиноподібне.

Рослини сорту стійкі проти хвороб і шкідників, стійкість квіток за зрізування 2 тижні. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

Полісся, Лісостеп, Степ

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся