

* Дані заявитника.

490

® 10246001 Граційний Танок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина кущового типу, напівпряма, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно червонуватих шилів. Листок середній, темно зеленого кольору, глянець з верхнього боку слабкий. Хвильястість краю листкової пластинки помірна. Кінцевий листочок овальний із тупою основою та верхівкою. Квітка округлої форми, напівлопна, велика. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Група кольору квітки рожева суміш, колір середини – рожевий. Аромат середній. Пелюстка серцеподібна, середня, зубчастість відсутня або дуже слабке. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Тичинкова нитка переважно оранжевого кольору.

* Дані заявитника.

* Висота рослини (см) - 150,Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -80, тривалість вегетаційного періоду (дн) -200,0.

Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявитника.

® 09246010 Емпінто

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно зеленуватих шилів. Листок довгий помірного зеленого кольору, від слабко до помірно глянцеватого з верхнього боку. Хвильястість краю листкової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок із заокругленою основою й овальною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, від середнього до великого діаметру. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено еліптична, середньої довжинизи ширинною -середня до широкої. Зубчастість слабка. Завертання країв відомі відсутні. На внутрішньому боці пелюстки один колір. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма від малого до середнього розміру, світло-жовтого кольору. Тичинкова нитка переважно червоного кольору.

* Дані заявитника.

Висота рослини (см) - 70-80,Період від вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) -2500, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246011 Емпара

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах є антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шилів. Листок середньої довжини, помірного зеленого кольору, глянець з верхнього боку середній. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок із серцевидною основою й округлою верхівкою. Квітка жовта, зіркоподібної форми, середнього діаметру. Профіль верхньої та нижньої частини плескато-випуклий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Членування чашолисток дуже сильне. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, яичеподібної форми, за довжиною та шириною від короткої до середньої. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір . Пляма на основі з внутрішнього боку пелюстки відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки оранжевий.

Висота рослини (см) - 70 - 80.Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) 2500,

Полісся, Лісостеп.