

® 10246001 Граційний Танок

Полісся, Лісостеп.

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

* Рослина кущового типу, напівпрямая, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середній, темно зеленого кольору, глянець з верхнього боку слабкий. Хвилястість краю листової пластинки помірна. Кінцевий листочок овальний із тупою основою та верхівкою. Квітка округлої форми, напівповна, велика. Профіль верхньої та нижньої частини плескатої. Група кольору квітки рожева суміш, колір середини – рожевий. Аромат середній. Пелюстка серцеподібна, середня, зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабе. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Тичинкова нитка переважно оранжевого кольору.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 150, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -80, тривалість вегетаційного періоду (дн) -200,0. Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246010 Емпінто

Закритий ґрунт

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно зеленуватих шипів. Листок довгий помірного зеленого кольору, від слабо до помірно глянцевого з верхнього боку. Хвилястість краю листової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок із заокругленою основою й овальною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, від середнього до великого діаметру. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатої. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено еліптична, середньої довжини за шириною -середня до широкої. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма від малого до середнього розміру, світло-жовтого кольору. Тичинкова нитка переважно червоного кольору.

* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 70-80, Період від вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) -2500, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246011 Емпара

Закритий ґрунт

Заявник: Бартелс Роуз Брідінг Б.В.

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах є антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середньої довжини, помірного зеленого кольору, глянець з верхнього боку середній. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок із серцевидною основою й округлою верхівкою. Квітка жовта, зіркоподібної форми, середнього діаметру. Профіль верхньої та нижньої частини плескато-випуклий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Членування чашолисток дуже сильне. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, яйцеподібної форми, за довжиною та шириною від короткої до середньої. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Пляма на основі з внутрішнього боку пелюстки відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки оранжевий.

Висота рослини (см) - 70 - 80. Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) 2500,

тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

® 09246003 Келих аромату

Заявник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

* Рослина клумбова, пряма, середньої висоти. Антоціанове забарвлення молодого пагона середнє. На стеблі середня кількість шипів червонуватого кольору. Листок середній, темно-зелений. Інтенсивність антоціанового забарвлення молодого пагона середня. Глянець верхнього боку відсутній або дуже слабкий. Хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із заокругленою основою та гострою верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. На нектитучих збіжистих пагонах квіток багато. Бутон у повздовжньому розрізі овальної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має велику кількість пелюсток, щільна. За профілем верхня частина квітки – плескато-випукла, нижня – увігнута. Аромат сильний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабке. Основний колір внутрішнього боку пелюстки темний пурпурово-червоний, світліший біля верхівки. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка коричнево-червона. Оплідень малий. Плід у поздовжньому перерізі ліровидний.

* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 100, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -58, тривалість вегетаційного періоду (дн) -174,0.

Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246007 Кримський самоцвіт

Заявник: Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, висока. На молодих пагонах антоціанове забарвлення відсутнє. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, темного зеленого кольору, з верхнього боку слабкий глянець. Хвилястість листової пластинки відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичної форми із тупою формою основи та загостреною верхівкою. Група кольору квітки зелена, колір середні жовтий. Квітка округлої форми, середнього діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої та нижньої частини плескатої. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, серцеподібної форми, коротка за довжиною та середня за шириною. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Основний колір зовнішнього боку пелюстки темно-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки рожевий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 70, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -90, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 270.

Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 07246018 Лексхаеп

Заявник: Левасі Лтд

* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору, з верхнього боку помірний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру з середньою кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатої. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, округла, середня за довжиною та шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв помірне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір.

Закритий ґрунт