

На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 70, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -50, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 2500, до 7 років, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 14.

* Дані заявника.

® 09246005 Місхор

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина клумбового типу росту, габітус прямий. Рослина середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення сильної інтенсивності. Стебло вкрите малою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок довгий, темно-зеленого кольору, з верхнього боку сильний глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок вузько-еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, великого діаметру з великою кількістю пелюсток. Профіль верхньої та нижньої частини плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, серцеподібної форми, середня за довжиною та шириною. Зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабе, хвилястість помірна. На внутрішньому боці пелюстки два кольори. Розташування вторинного кольору на внутрішньому боці пелюстки суцільно. Основний колір зовнішнього боку світло-зелений. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 120, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -92, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 270, зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника

® 09246008 Полька Бабочка

Заявник:

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр Української академії аграрних наук

* Рослина висока, витка. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення середньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно зеленуватих шипів. Листок довгий, темно-зеленого кольору, глянець з верхнього боку слабкий. Хвилястість краю листкової пластинки відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із гострою основою й загостреною верхівкою. Квітка округлої форми, повна, середнього діаметру. Профіль верхньої частини випуклий, нижньої – плескато-випукла. Група кольору квітки оранжева суміш, колір середини – оранжевий. Аромат середній. Пелюстка округла, середня, зубчастість відсутня або дуже слабка. Завертання країв відсутнє або дуже слабе, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Тичинкова нитка переважно жовтого кольору.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 250, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -70, тривалість вегетаційного періоду (дн) -270,0. Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246004 Первісток

Заявник:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

* Рослина клумбова, напівпрямая, середньої висоти. Інтенсивність антоціанового забарвлення молодого пагона слабка. На стеблі середня кількість шипів червонуватого кольору. Листок середній, помірно зелений. Глянець верхнього боку відсутній або дуже слабкий. Хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Кінцевий листочок еліптичний із заокругленою основою та гострою верхівкою. Квітучі

Степ, Лісостеп, Полісся

Полісся, Лісостеп, Степ

Полісся, Лісостеп, Закритий ґрунт

збіжисті пагони відсутні. На нектівучих збіжистих пагонах квіток дуже мало. Бутон у повздовжньому розрізі еліптичної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має середню кількість пелюсток, помірно щільна. За профілем верхня частина квітки – випукла, нижня – плеската. Аромат помірний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв слабе. Внутрішній бік пелюстки темний пурпурово-червоний. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка жовта. Оплідень малий. Плід у поздовжньому перерізі грушоподібний.

* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 80, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн) -180. Зимостійкість 5 балів.

* Дані заявника.

® 09246001 Схоюрі

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

Закритий ґрунт

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите шипами від середньої кількості до багата переважно червонуватих шипів. Листок довгий, помірного зеленого кольору, помірний глянець з верхнього боку, антоціанове забарвлення відсутнє. Край листової пластинки від дуже слабкої до слабкої хвилястості. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. Квітка повна, середнього діаметру з помірно щільною пелюсткою. Середина оранжева. Квітка зіркоподібної форми. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої – плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено-еліптична, за розміром від малої до середньої, за довжиною від короткої до середньої середня за шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір, основний колір на внутрішньому боці помаранчево-червоний. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма, від середнього до великого розміру, жовтого кольору. Домінуючий колір тичинкової нитки червоний.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 60, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 1825, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 11.

* Дані заявника.

® 09246002 Схекслу

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

Закритий ґрунт

* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Шипи відсутні. Листок середнього розміру, інтенсивність кольору від світлого до помірного, з верхнього боку помірний глянець. Хвилястість листової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок овальної форми із заокругленою основою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру, кількістю пелюсток від малої до середньої. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої – плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, обернено-еліптичної форми, від короткої до середньої за довжиною та від середньої до широкої за шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Основний колір на внутрішньому боці пелюстки освітлені до кремового (RHS 56 C-D). На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

* Дані заявника.

* Висота рослини (см) - 65, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 1825, 493