

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 15263003 Назва сорту: Імідж Заявник (код): 1837 Власник сорту (код): 1837

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.02.2018

Патент № 180809

Дата пріоритету: 09.04.2015

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: сила росту	помірна	5
2	Дерево: тип	розгалужений	2
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева: Дерево: габітус	похилий	3
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	світло-коричневе	3
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6
25	Плід: за висотою	середній	5
26	Плід: діаметр	середній	5
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5
28	Плід: основна форма	приплюснута-куляста	7
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1
31	Плід: розмір чашечки	середній	5
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	дуже велика	9
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	пурпурово-червоний	4
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	сильна	7
39	Плід: характер покривного забарвлення	суцільний рум'янець із слабко визначеними смугами	2
40	Плід: смуги за шириною	вузькі	3
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7
45	Плід: розмір сочевочок	середній	5
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	глибока	7
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1
55	Час початку цвітіння	ранній	3
56	Час збирання врожаю	дуже пізній	9
57	Час споживчої стиглості	пізній	7

За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності

Середня урожайність сорту становить 21,5 т/га. Середній урожай з дерева – 14,5 кг, середня маса плоду – 175,0 г, максимальна – 213,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 3,72, вміст загального цукру, % – 13,12, вміст пектинових речовин, % – 0,85, вміст сухої речовини в плодах, % – 13,13, загальна кислотність, % – 0,52. Стійкість до ураження борошнистою росою та паршею – 7 балів. До пошкодження попелицею – 6 балів. Зимостійкість – 8,7 балів. Ступінь підмерзання – 0,3 бала, вимерзання квіткових бруньок – 1 бал. Стійкість до посухи – 7,9 балів. Період зберігання – 231 доба. Група стиглості – пізньо-зимова. Напрямок використання – споживання у свіжому вигляді. Транспортбельність – 9 балів, дегустаційна оцінка – 8,3 бала.

## Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.