

збіжисті пагони відсутні. На некрівтучих збіжистих пагонах квіток дуже мало. Бутон у повздовжньому розрізі еліптичної форми. Квітка велика, повна, зіркоподібна. Має середню кількість пелюсток, помірно щільна. За профілем верхня частина квітки – випукла, нижня – плеската. Аромат помірний. Пелюстка велика, округла. Зубчастість і хвилястість краю відсутня або дуже слабка. Завертання країв слабе. Внутрішній бік пелюстки темний пурпурово-червоний. Пляма на основі відсутня. Тичинкова нитка жовта. Оплідень малий. Плід у поздовжньому перерізі грушоподібний.

\* Дані заявника.

Висота рослини (см) - 80, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн) -180.

Зимостійкість 5 балів.

\* Дані заявника.

## ® 09246001 Схоюрі

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

## Закритий ґрунт

\* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення слабкої інтенсивності. Стебло вкрите шипами від середньої кількості до багата переважно червонуватих шипів. Листок довгий, помірно зеленого кольору, помірний глянець з верхнього боку, антоціанове забарвлення відсутнє. Край листкової пластинки від дуже слабкої до слабкої хвилястості. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й загостреною верхівкою. Квітучі збіжисті пагони відсутні. Квітка повна, середнього діаметру з помірно щільністю пелюсток. Середина оранжева. Квітка зіркоподібної форми. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка обернено-еліптична, за розміром від малої до середньої, за довжиною від короткої до середньої середня за шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв сильне, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір, основний колір на внутрішньому боці помаранчево-червоний. На основі з внутрішнього боку пелюстки наявна пляма, від середнього до великого розміру, жовтого кольору. Домінуючий колір тичинкової нитки червоний.

\* Дані заявника.

\* Висота рослини (см) - 60, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 1825, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 11.

\* Дані заявника.

## ® 09246002 Схекслу

Заявник: ПІТ СХРЬОРС ХОЛДІНГ БВ (NL)

## Закритий ґрунт

\* Рослина за типом росту клумбова, габітус прямий, низька. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до середньої інтенсивності. Шипи відсутні. Листок середнього розміру, інтенсивність кольору від світлого до помірного, з верхнього боку помірний глянець. Хвилястість листкової пластинки від слабкої до помірної. Кінцевий листочок овальної форми із заокругленою основою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру, кількістю пелюсток від малої до середньої. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат відсутній або дуже слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, обернено-еліптичної форми, від короткої до середньої за довжиною та від середньої до широкої за шириною. Зубчастість слабка. Завертання країв від помірного до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. Основний колір на внутрішньому боці пелюстки освітлені до кремезового (RHS 56 C-D). На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Домінуючий колір тичинкової нитки світло-жовтий.

\* Дані заявника.

\* Висота рослини (см) - 65, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -75, тривалість вегетаційного періоду (дн) - 1825,

\* Дані заявника.

### ® 08246003 Тан01990

### Закритий ґрунт

Заявник:

Розен Тангау. Матиас Тангау Нахфольгер

\* Рослина від низької до середньої висоти. На молодих пагонах наявне антоціанове забарвлення від слабкої до помірногосередньої інтенсивності. Стебло вкрите середньою кількістю переважно червонуватих шипів. Листок середнього розміру, помірного зеленого кольору, з верхнього боку середній глянець. Листкова пластинка слабо хвиляста. Кінцевий листочок еліптичної форми із заокругленою основою й гострою верхівкою. Квітка зіркоподібної форми, середнього діаметру з середньою до великої кількістю пелюсток. Профіль верхньої частини плескато-випуклий, нижньої - плескатий. Аромат слабкий. Пелюстка з наявним послідовним відкриванням, обернено-еліптичної форми, середня за довжиною та середня до широкої за шириною. Зубчастість слабка до середньої. Завертання країв помірне до сильного, хвилястість слабка. На внутрішньому боці пелюстки один колір. На основі з внутрішнього боку пелюстки пляма відсутня. Основний колір зовнішнього боку світло блакитно-рожевий до фіолетового, світліший до основи. Домінуючий колір тичинкової нитки жовтий.

\* Дані заявника.

\* Висота рослини (см) - 60, Період від початку вегетації до початку цвітіння (дн) -60, тривалість вегетаційного періоду (дн)- 2500,до 7 років, тривалість збереження декоративної зрізки (дн) - 8 - 12.

\* Дані заявника.

## ФЛОКС ВОЛОТИСТИЙ

### ® 09248002 Біла Вежа

### Полісся, Лісостеп

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

\* Рослина дуже висока, напіврозлога. Антоціанове забарвлення, та опушення стебла – відсутнє, забарвлення під час повного цвітіння – світло-зелене. Листок широко ланцетний. Суцвіття середнє, щільне, округле. Забарвлення пуп'янка рожеве. Квітка середнього діаметру, пелюстки слабо перекриваються. Тип забарвлення верхнього боку - одноколірний. Основне забарвлення верхнього боку віночка - біле. Домінуюче забарвлення трубки віночка біле. Забарвлення не вигорає. Початок цвітіння пізній.

\* Рослини сорту зимостійкі, стійкі проти хвороб та шкідників. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 27 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Полісся, Лісостеп.

\* Дані заявника

### ® 09248001 Красень

### Полісся, Лісостеп

Заявник:

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

\* Рослина висока, компактна. Антоціанове забарвлення стебла наявне, опушення відсутнє, забарвлення під час повного цвітіння – темно-зелене. Листок широко ланцетний. Суцвіття велике, щільне, конічне з виступом. Забарвлення пуп'янка рожеве. Квітка середнього діаметру, пелюстки дуже перекриваються. Тип забарвлення верхнього боку - двоколірний. Основне забарвлення верхнього боку віночка - світле синьо-рожеве. Домінуюче забарвлення трубки віночка рожеве. Забарвлення не вигорає. Початок цвітіння пізній.

\* Рослини сорту зимостійкі, стійкі проти хвороб та шкідників. Період цвітіння від початку цвітіння до втрати декоративності 25 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Полісся, Лісостеп.

\* Дані заявника