

**Вид:** Нектарин *Prunus persica* (L.) Batsch var. *nucipersica* (Suckow) C.K. Schneid

**Заявка № 2025370001 Назва сорту:** Ерлі Стар 1 **Заявник (код):** 3417 **Власник сорту (код):** 3417

**Дата пріоритету:** 08.05.2025

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 11.06.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250339**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення                    | Код | Примітка |
|----|--|-------------------------------|-----|----------|
| 1  | Дерево: розмір   | середній                      | 5   |          |
| 2  | Дерево: за силою росту   | середнє                       | 5   |          |
| 3  | Дерево: габітус  | від напівпрямого до розлогого | 2   |          |
| 4  | Квітконосний пагін: за товщиною  | товстий                       | 7   |          |
| 5  | Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною                                   | довгі                         | 7   |          |
| 6  | Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення                                | наявне                        | 9   |          |
| 7  | Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення                | сильна                        | 7   |          |
| 8  | Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок                        | помірне                       | 5   |          |
| 9  | Квітка: тип  | розетковий                    | 2   |          |
| 10 | Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)                        | біле                          | 1   |          |
| 11 | Пелюстка: форма  | вузькоюяцеподібна             | 1   |          |
| 12 | Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною           | ознака не визначається        | 0   |          |
| 13 | Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною                 | вузька                        | 2   |          |
| 14 | Квітка: кількість пелюсток   | більше п'яти                  | 2   |          |
| 15 | Тичинка: розміщення відносно пелюсток                                      | нижче                         | 1   |          |
| 16 | Приймочка: розміщення відносно пиляків                                     | нижче                         | 1   |          |
| 17 | Пиляки: пилок  | наявний                       | 9   |          |
| 18 | Зав'язь: опушення  | відсутнє                      | 1   |          |
| 19 | Прилистки: за довжиною   | середні                       | 5   |          |
| 20 | Листкова пластинка: за довжиною  | довга                         | 7   |          |
| 21 | Листкова пластинка: за шириною   | широка                        | 7   |          |
| 22 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина                            | велике                        | 7   |          |
| 23 | Листкова пластинка: форма поперечного перерізу                             | увігнута                      | 1   |          |
| 24 | Листкова пластинка: форма краю   | городчаста                    | 1   |          |
| 25 | Листкова пластинка: кут основи   | гострий                       | 1   |          |
| 26 | Листкова пластинка: кут верхівки   | середній                      | 5   |          |
| 27 | Листкова пластинка: забарвлення  | світло-зелене                 | 2   |          |
| 28 | Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка | відсутнє                      | 1   |          |
| 29 | Черешок: за довжиною   | короткий                      | 3   |          |
| 30 | Черешок: нектарники  | відсутні                      | 1   |          |
| 31 | Черешок: форма нектарників   | ознака не визначається        | 0   |          |
| 32 | Плід: розмір   | середній                      | 5   |          |
| 33 | Плід: форма (вигляд збоку)   | округла                       | 3   |          |
| 34 | Плід: загострення маточкового кінця  | відсутнє                      | 1   |          |
| 35 | Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)                    | плоска                        | 3   |          |
| 36 | Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)                           | симетричний                   | 1   |          |
| 37 | Плід: помітність шва   | слабка                        | 3   |          |
| 38 | Плід: ямка плодоніжки за глибиною  | мілка                         | 3   |          |
| 39 | Плід: ямка плодоніжки за шириною   | вузька                        | 3   |          |
| 40 | Плід: основне забарвлення шкірки   | оранжево-жовте                | 11  |          |
| 41 | Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки                         | дуже велика                   | 9   |          |
| 42 | Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки                               | темно-червоний                | 6   |          |
| 43 | Плід: рисунок покривного забарвлення                                       | суцільний рум'янець           | 1   |          |
| 44 | Плід: опушення шкірки  | відсутнє                      | 1   |          |
| 45 | Плід: щільність опушення шкірки  | ознака не визначається        | 0   |          |
| 46 | Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глясуватість              | відсутня або дуже слабка      | 1   |          |
| 47 | Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок       | слабка                        | 1   |          |
| 48 | Плід: шкірка за товщиною   | середня                       | 5   |          |
| 49 | Плід: зростання шкірки із м'якоттю   | дуже слабке                   | 1   |          |
| 50 | Плід: твердість м'якоті  | середня                       | 5   |          |
| 51 | Плід: основне забарвлення м'якоті  | оранжево-жовте                | 6   |          |
| 52 | Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою            | відсутнє або дуже слабке      | 1   |          |
| 53 | Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті                | відсутнє або дуже слабке      | 1   |          |
| 54 | Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки                     | помірне                       | 2   |          |
| 55 | Плід: волокнистість м'якоті  | відсутня або слабка           | 1   |          |
| 56 | Плід: цукристість  | середня                       | 5   |          |
| 57 | Плід: кислотність  | дуже низька                   | 1   |          |
| 58 | Кісточка: розмір у порівнянні з плодом                                     | малий                         | 3   |          |
| 59 | Кісточка: форма (вигляд збоку)   | сплюснута                     | 1   |          |
| 60 | Кісточка: антоціанове забарвлення  | відсутнє або дуже слабке      | 1   |          |
| 61 | Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення                            | середня                       | 5   |          |
| 62 | Кісточка: рельєфність поверхні   | порівну ямки і борідки        | 3   |          |
| 63 | Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)                       | слабка                        | 3   |          |
| 64 | Кісточка: зростання з м'якоттю   | наявне                        | 9   |          |
| 65 | Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю                                     | помірний                      | 5   |          |
| 66 | Час початку розпускання вегетативних бруньок                               | ранній                        | 3   |          |

| №  | Ознака                  | Проявлення  | Код | Примітка |
|----|-------------------------|-------------|-----|----------|
| 67 | Час початку цвітіння    | ранній      | 3   |          |
| 68 | Час споживчої стиглості | дуже ранній | 1   |          |

**За інформацією, наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Сила росту: середня – 5. Група стиглості: дуже рання – 1. Ступінь самоплідності, % – 99. Урожайність, т/га – 32,5. Середня маса плоду, г – 215,0. Маса кісточки, г – 22,0. Відокремлення кісточки від м'якоти: не відокремлюється – 1. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Лежкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кучерявість листків – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): муха вишнева – 8, попелиця – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**