

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 2025110002 Назва сорту: ВН0312 **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Володілець патенту (код): 3236

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.07.2025 **Патент № 250146**

Дата пріоритету: 16.04.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.07.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250358

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	довга	7	
4	Листкова пластинка: положення	пряме	1	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	гостра	1	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	сильна	7	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноеційність	2	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 3 або 4	5	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	ознака не визначається	0	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	середній	5	
36	Плід: смужки за довжиною	довгі	7	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	2/3 довжини	3	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	коричневе	5	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 162. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 39. Тривалість періоду плодоношення, діб – 82.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.