

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.

Заявка № 2025006002 Назва сорту: СЕНЕКА Заявник (код): 2440 Власник сорту (код): 2440

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 25.02.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250170

Орган, що провів випробовування: CREA (Italy)

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	світло-коричневе
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабе	1	
3	Рослина: габітус	від прямого до напівпрямого	2	ближче до напівпрямого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	від слабкого до помірного	4	ближче до помірного
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	дуже сильний	9	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	помірне	5	до сильного
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	у верхній половині колоса	3	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	коротша	1	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	до злегка припіднятого
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	від вузького до середнього	4	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	слабке	3	
22	Остюки: забарвлення	коричневе	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	від короткого до середнього	4	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	біле	1	
26	Колос: форма	циліндрична	2	
27	Колос: за щільністю	помірний	5	
28	Зернівка: форма	середньоподовжена	2	
31	Тип розвитку	ярий	3	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,5
2	Висота рослини, см	95
3	Тривалість періоду вегетації, діб	97
4	Маса 1000 зерен, г	49
5	Стійкість до вилягання, бал (1–9)	8
6	Стійкість до обсіпання, бал (1–9)	8
7	Стійкість до посухи, бал (1–9)	7
8	Стійкість до проростання в колосі, бал (1–9)	8
9	Натура зерна, г/л	81
10	Вміст білка, %	14,3
11	Вміст сирої клейковини, %	35
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кореневі гнилі (<i>Leptosphaeria herpotrichoides</i> de Not., <i>Ophiobolus graminis</i> Sacc., <i>O. herpotrichoides</i> (Fr.) Sacc.)	7
13	- борошниста роса (<i>Erysiphe graminis</i> DS. f. <i>tritici</i> Marchal)	8
14	- бура іржа (<i>Puccinia triticina</i> Erikss.)	7
15	- стеблова (лінійна) іржа (<i>Puccinia graminis</i> Pers. f. <i>tritici</i> Erikss. et Henn.)	7
16	- септоріоз (<i>Septoria tritici</i> Desm., <i>S. nodorum</i> Berk)	6
17	- фузаріоз колоса (<i>Fusarium graminearum</i> Schw.)	6
18	- тверда сажка (<i>Tilletia tritici</i> Wint.)	7
19	- летюча сажка (<i>Ustilago tritici</i> (Pers.) Jens.)	6
20	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): внутрішньостеблові	5
21	- клоп-черепашка (<i>Eurygaster integriceps</i> Put.)	5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.