

Вид: Люцерна мінлива *Medicago × varia* Martyn**Заявка № 89392001 Назва сорту:** Унітро **Заявник (код):** 411 **Власник сорту (код):** 3221**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 01.01.1994**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сіви (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сіви)	довга	7	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьофіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	висока	7	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	низька	3	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	висока	7	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сіви (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сіви (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 5	5	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	відсутня	1	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	відсутня	1	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	відсутня	1	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	відсутня	1	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0	