

Вид: Лілійник гібридний *Hemerocallis hybrida* hort.**Заявка № 14498012 Назва сорту:** Зірка **Заявник (код):** 317 **Власник сорту (код):** 317**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.03.2018**Патент № 180365****Дата пріоритету:** 23.07.2014**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	міцно спляча	1
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	розлогий	2
6	Листок: положення у просторі	пряме	1
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	світло-зелене	1
10	Квітконос: розташування відносно листків	високо підніяті над листками	3
11	Квітконос: залистаність	наявна	9
12	Суцвіття: за щільністю	нешільне	1
13	Суцвіття: приквітки	наявні	9
14	Суцвіття: за довжиною	довге	7
15	Час цвітіння	середній	4
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	середня	5
19	Квітка: кількість на рослині	велика	7
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	середня	5
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	зіркоподібна	3
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	рожеве	3
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	двотонова	4
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	синьо-рожеве	19
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	оранжево-рожеве	15
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	світло-синьо-рожеве	18
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
30	Квітка: візерунок	ореол	5
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	пурпурово-червоне	23
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	синьо-рожевий	19
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	світло-синьо-рожеве	18
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітина: відносне розташування часток	дотичне	3
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	тупа	4
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвильстий	2
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвильстий	2
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: за довжиною тичинки	коротка	3
48	Тичинка: основне забарвлення	синьо-рожеве	19
49	Тичинка: забарвлення піляків	пурпурове	4
50	Пилок: забарвлення	жовте	2
51	Пилок: життєздатність	низька	3
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	низький	3
53	Стовпчик: основне забарвлення	синьо- рожеве	19
54	Квітка: положення приймочки відносно піляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	синьо- рожеве	19
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини становить 80 см. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння – 85 діб. Тривалість цвітіння суцвіття – 35 діб. Тривалість цвітіння рослини – 50 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність – 95 балів. Коєфіцієнт вегетативного розмноження – 30%. Зимостійкість та посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти пошкодження комариком лілійника та павутинним кліщем – 8 балів. Стійкість проти ураження гнилями кореневої шийки – 7 та хлорозом – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.