

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 23020006 Назва сорту:** Володьководівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

**Володілець патенту (код):** 1990

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.10.2025 **Патент № 250281**

**Дата пріоритету:** 21.11.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250483**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                  | Код | Примітка |
|----|---|-----------------------------|-----|----------|
| 1  | Рослина: габітус (форма куща)   | напіврозлогий               | 5   |          |
| 2  | Нижні листки: опушення піхви  | відсутнє                    | 1   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                           | наявне                      | 9   |          |
| 4  | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок           | помірна                     | 5   |          |
| 5  | Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком                    | мала                        | 3   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                                 | сильний                     | 7   |          |
| 7  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                 | середній                    | 5   |          |
| 8  | Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків                                    | наявне                      | 9   |          |
| 9  | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків                    | помірна                     | 5   |          |
| 10 | Колос: восковий наліт   | відсутній або дуже слабкий  | 1   |          |
| 11 | Колос: положення в просторі   | горизонтальне               | 5   |          |
| 12 | Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)                              | середня                     | 5   |          |
| 13 | Колос: кількість рядів  | два                         | 1   |          |
| 14 | Колос: форма  | пірамідальна                | 3   |          |
| 15 | Колос: за щільністю   | середній                    | 5   |          |
| 16 | Колос: за довжиною (з остюками)   | довгий                      | 3   |          |
| 17 | Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)                                   | довгі                       | 7   |          |
| 18 | Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента                               | середній                    | 5   |          |
| 19 | Стрижень колосу: вигин першого сегмента                                     | малий                       | 3   |          |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)                   | паралельне                  | 1   |          |
| 21 | Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки    | довші                       | 3   |          |
| 22 | Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною                              | короткі                     | 1   |          |
| 23 | Зернівка: плівчастість  | наявна                      | 9   |          |
| 24 | Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски          | слабка                      | 3   |          |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски        | слабке                      | 3   |          |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної боріздки                                     | відсутнє                    | 1   |          |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул  | охоплююче                   | 2   |          |
| 28 | Зернівка: забарвлення алеїронового шару                                     | слабке забарвлення          | 2   |          |
| 29 | Тип розвитку  | ярий                        | 3   |          |
| 30 | Колос: остюки   | наявні                      | 9   |          |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення                       | остюки                      | 5   |          |
| 32 | Зернівка: форма   | еліптична                   | 3   |          |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски                               | губозморшкувата             | 9   |          |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски | відсутнє                    | 1   |          |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка                  | поступовий                  | 2   |          |
| 36 | Вушка: форма верхівки   | шилоподібна                 | 3   |          |
| 37 | Вушка: охоплення соломини   | перекриваюче                | 3   |          |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення   | сильний                     | 7   |          |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)          | слабко виповнена            | 3   |          |
| 40 | Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)                            | наявне                      | 9   |          |
| 41 | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення                                 | помірна                     | 5   |          |
| 42 | Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)             | відсутній або рундментарний | 1   |          |
| 43 | Квіткова луска: форма основи  | не скошена                  | 1   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник  | Значення |      |      |
|---|----------|------|------|
|   | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 4,04     | 5,29 | 4,37 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 5,30     | 5,86 | 6,71 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   | 1,26     | 0,57 | 2,34 |
| +, - до усередненої урожайності, %  | 31,2     | 10,8 | 53,5 |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,13     | 0,11 | 0,09 |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 87       | 93   | 90   |
| Висота рослини, см  | 65,2     | 68,9 | 66,8 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 45,6     | 48,1 | 48,6 |
| Вміст білка, %  | 12,6     | 11,8 | 10,6 |
| Вирівняність зерна, %   | 88,4     | 94,6 | 96,3 |
| Стійкість до вилягання, бал   | 7        | 7    | 8    |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість до посухи, бал  | 9        | 7    | 8    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 9        | 7    | 8    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал   | 9        | 8    | 7    |
| Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал  | 6        | 7    | 7    |
| Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал  | 9        | 9    | 9    |
| Блок  | 1        | 1    | 1    |
| Напрямок використання   | зерн     | зерн | зерн |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**