

**Вид:** Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 23020007 Назва сорту:** Обрій Носівщини **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

**Володілець патенту (код):** 1990

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.10.2025 **Патент № 250282**

**Дата пріоритету:** 28.11.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250484**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегмента	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	відсутня	1	
24	Зернівка: антоціанове забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	ознака не визначається	0	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,38	4,53	4,22
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,20	5,30	5,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,82	0,77	1,34
+, - до усередненої урожайності, %	24,3	17,0	31,8
Довірчий інтервал, т/га	0,71	0,46	0,32
Тривалість періоду вегетації, діб	87	93	90
Висота рослини, см	67,3	70,4	74,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,4	45,6	44,6
Вміст білка, %	14	12,5	11,4
Вирівняність зерна, %	78,3	89	78,9
Стійкість до вилягання, бал	8	6	6
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	6
Стійкість проти гельмінтоспоріозу, бал	7	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**