

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.

Заявка № 24147002 Назва сорту: Чарентайс Заявник (код): 1163 Підтримувач сорту (код): 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250505

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5	
11	Черешок: за довжиною	середній	5	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	сірувато-зелений	4	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	помірна	5	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	слабка	3	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	товста	7	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на ранніх стадіях розвитку плоду	1	
24	Плід: за довжиною	короткий	3	
25	Плід: діаметр	малий	3	
26	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма позовжнього розрізу	округла	4	до сплюснутої
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	слабка	3	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	жовтуватий	3	
32	Плід: щільність крапок	відсутня або дуже нещільна	1	
33	Плід: розмір крапок	ознака не визначається	0	
34	Плід: забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	ознака не визначається	0	
36	Плід: щільність плям	середньої щільності	5	
37	Плід: розмір плям	малий	3	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	слабка	3	
40	Плід: форма основи	плеската	3	
41	Плід: форма верхівки	плеската	3	
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5	
43	Плід: борізки	слабо виражені	2	
44	Плід: борізки за шириною	середні	5	
45	Плід: борізки за глибиною	мілкі	3	
46	Плід: забарвлення боріздок	зелене	3	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3	
48	Плід: коркове утворення	відсутнє	1	
49	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначається	0	
50	Плід: візерунок коркового утворення	ознака не визначається	0	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	ознака не визначається	0	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якість в позовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	товста	7	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5	до черво- нувато- оранжевого
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	помірна	5	до сильної
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
57	Плід: консистенція м'якоті	м'яка	3	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	коротка	3	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
61	Насінина: за шириною	середня	5	
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	короткий	3	
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 41. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, діб – 80. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 38. Вміст сухої речовини в плодах, % – 10,1; загального цукру, % – 14. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщ, трипс – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса, роса 2,5 – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.