

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.**Заявка №** 2025127002 **Назва сорту:** РОККЕНКУРТ **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.10.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250508**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилля	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	висока	7	до дуже високої
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	від округлої до ромбічної	4	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквітів	малий	3	до середнього
16	Квітка: забарвлення паруса	фіолетове	4	
17	Квітка: забарвлення крил	фіолетове	4	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	до довгого
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	серцеподібна	3	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб : основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	слабкий	3	до помірного
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	заокруглена	3	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабко шерехата	3	до помірно шерехатої
36	Біб: звуження (у сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	від округлої до еліптичної	2	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	ознака не визначається	0	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	еліптична	3	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3	
42	Насінина: за довжиною	середня	5	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	чорне	9	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина : вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	до пізнього
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Paca 6	наявна	9	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMV)	відсутня	1	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	відсутня	1	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	відсутня	1	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 13,0. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 8,2. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55–58. Тривалість плодоношення, діб – 32. Кількість бобів на рослині, шт. – 10. Вміст білка у бобах, % – 13,8; сухої речовини, % – 15,1; загального цукру, % – 3,6; вітаміну С, мг/100 г – 20,3. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 4; аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3г.