

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.**Заявка №** 2025304003 **Назва сорту:** Совіньйон Блан **Заявник (код):** 3408 **Підтримувач сорту (код):** 3408**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.10.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250500**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	ранній	3	до середнього
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	середня	5	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабе	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільні	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	до зеленого
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	середня	5	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільні	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	вертикальне	1	до напіввертикального
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене	1	до зеленого і червоного
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене	1	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільні	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	середні	5	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	помірна	5	до сильної
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	мілкі	3	до середніх
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	слабко відкрите	4	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	короткі	3	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	нещільна	3	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільні	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	малий	3	до середнього
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного гроно за довжиною	дуже коротка	1	
35	Ягода: розмір	середній	5	
36	Ягода: форма	вузькоеліптична	4	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	зелене	1	до жовто-зеленого
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	тонка	1	середньої
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабе	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або слабко тверда	1	
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5	
43	Ягода: утворення насіння	повноцінне	3	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	оранжево-коричневе	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 11,0. Середній урожай з куща, кг – 5,0. Середня маса 100 ягід, г – 150,0. Середня маса гроно, г – 120,0. Горошіння ягід, % – 10,0. Розтріскування ягід, % – 5,0. Лежкість при зберіганні, діб – 3. Вихід соку, % – 75,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 0; кислот у ягодах, г/л – 9,0. Цукристість соку ягід, % – 24,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 7; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 3. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, діб – 130–135. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 6. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 5. Група стиглості – сс. Напрямок використання – тхн. Схема садіння, м – 3 х 1. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.