

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 23040011 Назва сорту:** Андор **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Володілець патенту (код):** 912**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.10.2025 **Патент № 250244****Дата пріоритету:** 01.05.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 08.10.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію № 250472****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	до середніх
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плідоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плідоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,85	3,11	3,47
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,02	-0,28	0,22
+, - до усередненої урожайності, %	-0,7	-8,3	6,8
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	290	299	297
Висота рослини, см	127,6	127,1	132,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	5	5,4	5,5
Вміст білка, %	19	17,1	17,7
Вміст олії, %	46,6	48,5	48,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	1	0,9	0,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	8	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.